



Esmeralda Jiménez Jiménez

Dra. Karla Sofia Lopez Gutiérrez

Esquema de Vacunación

Pediatría

Grado: 6°

Grupo: B

Comitán de Domínguez Chiapas a 7 Abril de 2025

Esquema de Vacunación

Vacuna	Dosis	Efectos adversos	Contraindicaciones	Edad	Vía de administración
BCG (auto Tb meningea)	0.1ml	Papada que se ulcera y causa cicatriz (90-95%)	SIDA, tx inmunosupresor, leucemia, neoplasias o linfopenia.	• Menor de 1 año	Intradérmica • Región del tercio medio del brazo derecho
Hep B	0.5ml	Fiebre, Fatiga, Síntomas gastrointestinales.	Fiebre $>38.5^{\circ}$, hipersensibilidad	• menor de 1 año	Intramuscular • tercio medio del codo antero lateral externo del muslo izquierdo. • Entras 24 hrs de vida
Hexavalente acelular (d.t.f, tétan, polio, hep B y H. Influenzae tipo B)	0.5 ml			• menores de 1 año • 2 a 4 meses de edad	• Intramuscular en el tercio medio de la cara anterolateral externa del muslo derecho
Antirrotavirus	0.5 ml	Fiebre y Mialgia	Alergia al huevo, Guillain barre por vacuna previa y Fiebre $>38.5^{\circ}\text{C}$	• 2-4 meses de edad	• Vía Oral • Administrar por la boca.
Neumococo conjugado	0.5 ml	Enteña, dolor, irritación, fiebre e irritabilidad	Fiebre $>38.5^{\circ}$, Hipersensibilidad	• 2-4 y 12 meses de edad.	Intramuscular muslo derecho
Antiinfluenza	0.5 ml	Fiebre y Mialgia	Alergia al huevo, Guillain barre por vacuna previa y Fiebre $>38.5^{\circ}\text{C}$	6-35 meses • 3-6 meses • Adultos y Adolescentes	Intramuscular
Triple Viral SRP	0.5	Fiebre, rash, cefalea, parálisis, meningitis, 100% par.	Inmunodeficiencia, Fiebre $>38.5^{\circ}\text{C}$, enf. neurológica, TB s/tx, Transfusión.	• Niños y niñas de 1 año	Subcutánea
DPT	0.5ml	Fiebre y Síntomas locales	Anafilaxia, encefalopatía enf. neurológica progresiva, en sus convulsivos.	• Niños y niñas de 4 años.	Intramuscular