



Claudia Patricia Abarca Jiménez

Dra. Karla Sofia López Gutiérrez

Cuadro comparativo.

Pediatría

6°

“B”

Comitán de Domínguez Chiapas a 25 de mayo del 2025.

NOMBRE	CAUSA	DIA DE APARICIÓN	SINTOMAS	TRATAMIENTO.
Fisiológica	- Desarrollo insuficiente en proceso de captación, conjugación transporte ↑ Hematocrito ↓ Flora intestinal	>> 2-3 días	- Ictericia leve. - Bilirrubina serica < 35 SDG	Fototerapia 8-6 hrs Hidratación correcta Serumalbumina
Exclusiva de lactancia materna.	- Baba ingesta - Deshidratación - Defecación tardía.	> 4-7 días	Bilirrubina elevada 3-12 mg/dL.	Fototerapia 4-6 hrs Exanguinotransfusión ↓ G-207. BT
Incompatibilidad ABO	- Madre o RN: A, B, AB	>> Primeras 24 hrs	- Ictericia leve - No hidrops	Fototerapia 2-6 hrs
Incompatibilidad RH.	- Embarazada Rh(-) no sensibilizado - Padre Rh + o desconocido	>> Primeras 24 hrs	- Anemia fetal grave - Hiperbilirrubinemia severa - Hidrops - Hipotomía.	Solicitar cobombs directo Hb, bilirrubina, albumina Fototerapia / Exanguinotransfusión