

ICTERICIA NEONATAL

Nombre	Día de aparición	Síntoma	Causa	Tratamiento
Fisiológica	2 a 3 días	• Letargia • Falta de apetito • Ictericidad • Fiebre • Dificultad respiratoria	• Producción aumentada de bilirrubina, prematuro • Inmadurez hepática • Mayor reabsorción intestinal	No se necesita tratamiento
Lactancia Materna	4 a 7 días	• Coloración amarilla en los ojos y piel • Orina oscura, heces palidas • Somnolencia o letargia • Pérdida del apetito	• Inhibidores del glutamil transferasa en leche materna • Aumento de la absorción de bilirrubina	Continuar con lactancia materna Monitorear los niveles de bilirrubina fototerapia en algunos casos
Incompatibilidad RH	24 hrs grave 48-72 hrs moderada	• Progresión rápida letargia • Anemia hemolítica • Hepatoesplenomegalia • Hiperesplenismo • Dificultad para alimentarse	• Incompatibilidad RH madre y feto • Destrucción de glóbulos rojos • Producción de Ac RH de la madre	Fototerapia intensiva Inmunoglobulina IV
Incompatibilidad ABO	Primeras 24 hrs	• Palidez • Orina oscura • Hepatoesplenomegalia • Datos de Kernicterus en etapas avanzadas • Letargia	• Madre con grupo sanguíneo O y bebé con A o B • Producción de Ac IgG anti-A o Anti-B	Fototerapia 1ra línea Inmunoglobulina IV