



Oscar Eduardo Guillén Sánchez

Dra. Karla Sofia López Gutiérrez

Pediatría

Cuadro comparativo

6-B

Tipo de Ictericia	Causas	Sintomatología	Días de aparición	Tratamiento
Ictericia Fisiológica	→ Inmadurez hepática → Reducción de la conjugación de bilirrubina	→ Coloración amarillenta de piel y mucosas	→ 2° al 3° día de vida. → Pico en el 4° y 5° día.	→ Observación → Alimentación adecuada → Fototerapia.
Ictericia por lactancia.	→ Baja ingesta de leche → Déficit calórico por mala técnica → Producción insuficiente de leche	→ Ictericia leve a moderada → Signos de deshidratación leve.	→ Primeros 3 a 5 días de vida	→ Mejorar Tec. de lactancia → ↑ frecuencia de tomas → Fototerapia si es necesario.
Incompatibilidad ABO	→ Madre grupo "O" y bebé "A" o "B" → Anticuerpos maternos atacan glóbulos rojos	→ Ictericia temprana e intensa → Anemia → Posible hepatomegalia	→ Primeras 24 hrs de vida	→ Fototerapia intensiva → Inmunoglobulina IV. → Exanguineo transfusión en caso severo.
Incompatibilidad RH.	→ Madre Rh negativo y bebé Rh positivo	→ Ictericia intensa → Anemia severa	→ Primeras 24 hrs o intrauterino	→ Fototerapia → Inmunoglobulina IV → Exanguineo transfusión → Prevención contra anti-D. en madre.