



**Nombre del alumno: Rashel Citlali
Rincón Galindo**

**Nombre del profesor: Karla Sofía
López Gutiérrez**

**Nombre del trabajo: Cuadro
Comparativo**

Materia: Pediatría

Grado: 6

Grupo: B

CUADRO COMPARATIVO

Cefalohematoma	Caput
Hemorragia supratentorial que se produce en la cabeza de RN, causando una acumulación de sangre entre cráneo y cuero cabelludo	Acumulación de sangre entre el tejido celular subcutáneo y la aponeurosis por el canal de parto.
Se causa por una presión de la cabeza del bebé contra la pelvis de la madre. 2-3 días de vida	Se ocasiona por una presión natural de la cabeza del bebé en el canal del parto. Inmediato - Parto.
Se presenta en 25% de los nacidos vivos. - Común en madres primerizas - Parto con fórceps mayor 16 veces el riesgo	o Frecuente en recién nacidos o Frecuente en partos vaginales o Fórceps aumenta el riesgo.
o Área suave y abultada en la parte trasera del cráneo o No sobrepasa suturas o Dolor o Sin afectación en la piel	o Edema o Piel equimosis y hematoma o Mas blanda y fluctuante
o Examen físico o Medición de hematocrito	o Exploración física
Suele resolverse por si sola y no requiere tratamiento	La + desaparece sin necesidad de intervención médica.