



**Nombre del alumno: Leslie Dennis
Cabrera Sanchez**

**Nombre del profesor: Dra. Karla
Sofia López Gutiérrez**

Actividad: Esquema de vacunación

Materia: Pediatría

Grado: 6

Grupo: B

Comitán de Domínguez Chiapas a 06 abril 2025

ESQUEMA DE VACUNACION

VACUNA	DOSES	EDAD	REGION	EFFECTOS ADVERSOS	CONTRAINDICACIONES
B CG (enterob Meningea)	0.1 ml	- 2-3 día del nacimiento - Hasta 14 años	- Vía intradérmica - Región Sub deltoidea brazo derecho	- Pórea que se abra y causa cresta (90-95%)	- SIDA, TX. Inmuno supresor, leucemia, neoplasias o inmunodeficiencia
HEP B	0.5 ml	1da dosis al nacer 2da 102 meses 3era 6-18 meses	- Intramuscular	- Fiebre - Fatiga - Síntomas gastrointestinales	- Fiebre > 38.5° - Hipersensibilidad
Hexavalente acediar (DPT, tétan, poli, HEP B y H. Inf. B)	0.5	1era 2 meses 2da 4 meses 3da 6 meses Refuerzo 18 meses	- Vía intramuscular - Área anterolateral superior del muslo > 18 meses - Tránsito de brazos	- Fiebre - Irritabilidad - Somnolencia - Vómitos	
Antirrotavirus	1.5 ml	1era 8 semanas de edad - 8 meses de edad	- Vía oral	- Síntomas gastrointestinales - Fiebre - Irritabilidad	- Alergia al látex - Antecedentes de intolerancia - Malformaciones congénitas no corregidas
Neumococo conjugado	0.5 ml	- 2 meses de edad - 2, 4, 6 y de 12-15 meses de edad	- Deltoides - Parte anterolateral del muslo - Vía intramuscular	- Eritema - Dolor - Fiebre - Irritabilidad	- Fiebre > 38.5° - Hipersensibilidad
Antinfluenza	0.5	- 6-59 meses - Primera 2 dosis Intervalo de 4 semanas - 1 vez al año	- Músculo del brazo izq. - Vía intramuscular	- Fiebre - Mialgia	- Alergia al huevo - Guillain Barre por vacuna previa - Fiebre > 38.5°

Triple viral SVP	0.5 ml	- 1era 12 y 15 meses 2da 4 y 6 años	- Brazo izquierdo - Tercio medio del vómito - Subcutánea	- Fiebre - Rash - Otitis - Parotiditis - Meningitis - Papera	- Inmunodeficiencia - Fiebre > 38.5° - Enf. Neurológica - TB S/TX - Transfusión o que no recaben 16 3-11
DPT	0.5 ml	- 2 meses - Refuerzo 4 años	- Vía intramuscular - Brazo izq. en el muslo	- Fiebre - Síntomas locales	- Anafilaxia - Encefalopatía - Crisis convulsivas
Antinfluenza	0.5 ml	- 6-59 meses - Primera dosis 2 Intervalo de 4 semanas - 1 vez al año	- Músculo del brazo izq. - Vía intramuscular	- Fiebre - Mialgia	- Alergia al huevo - Guillain Barre por vacuna previa - Fiebre > 38.5°