



JUAN PABLO ABADIA LOPEZ

DRA. KARLA SOFIA LOPEZ GUTIERREZ

Esquema de vacunación

Pediatría

PASIÓN POR EDUCAR

6

B

Comitán de Domínguez Chipas a 2 de Marzo del 2025

VACUNA	DOSES	Efectos Adversos	CONTRAINDICACIONES	VIA ADMINISTRACION	EDAD DE APLICACION
BCG	0.1 ml Dosis unica	• Papulo que se ulcera y Causa cicatriz (90-95%)	SIDA, Tix Intinuro Supresor leucemia neoplasia.	INTRA DERMICA	RECEN NACIDO
HEPATITO B	0.5 ml	Fiebre, rash Síntomas gastrointestinales	Fiebre > 38.5° hipersensibilidad	INTRA MUSCULAR	18 meses de edad
ANTIINFLUENZA	0.5 ml	Fiebre y malestar	Alergia al huevo Gullon baxoporcucino Fiebre y Fiebre	INTRA MUSCULAR	NIÑOS de 6 a 11 meses 2da dosis a los meses de la primera
ANTIROTAVIRUS	1.5 ml	Síntomas gastrointestinales Fiebre irritabilidad	Alergia a la leche antecedentes de Intoxicacion materna Consejos no corregidos de tracto GI	ORAL	1da = 2 meses hasta 3 2da = 4 meses hasta 7
NEUMOCOCCICA CONJUGADA	0.5 ml	Eritema, dolor, Inflamacion, Fiebre = irritabilidad	Fiebre > 38.5° hipersensibilidad	Intramuscular	1ra dosis = 2 meses 2da = 4 meses 3ra = 6 meses
TRIPLE VIRAL SRP	0.5 ml	Fiebre, rash, Cefalea Parotiditis, meningitis Purpuro	Immunodeficiencia, Fiebre > 38.5°C Enr. Neurologica Tronco o cerebello IG Expono 5-11 meses	SUBCUTANEA	De 12 a 23 meses
DPT	0.5 ml	Fiebre y síntomas locales	Aron laxia, atrofia Enr. Neurologica Progredura, Crisis Convulsiva.	INTRAMUSCULAR	DE 4 a 9 años 1ra dosis 2da dosis a los 2 meses.
HEXAVALENTE ACECLAR	0.5 ml	Dolor de la inyeccion Irritabilidad eritema Fiebre	Antecedentes de reacciones a algun componente de la vacuna o Fiebre	INTRAMUSCULAR	2 meses y 18 meses

FIRST CLASS

