



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Cielo Brissel Fernández Colín

Dra. Karla Sofía López Gutiérrez

CUADRO COMPARATIVO

PEDIATRÍA

6"B"

Comitán de Domínguez Chiapas a Abril de 2025

VACUNAS

VACUNA	DOSES	VÍA de ADMINISTRACIÓN	CONTRAINDICACIÓN	EFFECTOS ADVERSOS	EDAD
BCG (Evita Tb meningea)	0.1 ml	Vía intradérmica, en la región deltoidea del brazo derecho	Sida, tx inmunosupresor, leucemia, neoplasias o inmunodeficiencia	Pápula que se ulcera y causa cicatriz (90-95%)	Nacimiento
Hep B	0.5 ml	Vía intramuscular, en el tercio medio de la cara anterolateral externa del muslo izquierdo	Fiebre $>38.5^{\circ}$, hipersensibilidad.	Fiebre, fatiga, síntomas gastrointestinales.	Nacimiento 2 y 6 meses
Hexavalente acelular (difteria, tétanos, tosferina, polio, hepatitis B y H. Influenzae tipo B).	0.5 ml	Vía intramuscular en el tercio medio de la cara anterolateral externa del muslo derecho en <18 mes. y en la región deltoidea del brazo izq a los 18 meses.	Anafilaxia, encefalopatía no explicada dentro de los 7 días posteriores a una dosis previa, enfermedad febril, convulsiones.	Dolor, enrojecimiento, edema, fiebre, irritabilidad, somnolencia, pérdida temporal del apetito, vómito ocasional, llanto persistente	2, 4 y 6 meses Refuerzo a los 18 meses.
Antirrotavirus	1.5 ml.	vía oral	Alergia al latex, antecedentes de intususcepción, malformaciones congénitas no corregidas del tracto GI	Síntomas gastrointestinales, fiebre, irritabilidad.	2 y 4 meses
Neumocócica Conjugada	0.5 ml	Vía intramuscular, en el tercio medio de la cara anterolateral externa del muslo derecho	Fiebre $>38.5^{\circ}$, hipersensibilidad	Eritema, dolor, induración, fiebre e irritabilidad	2, 4 y 12 meses
Antinfluenza	0.5 ml	Vía intramuscular, en el tercio medio de la cara anterolateral externa del muslo izq en <18 meses y en la región deltoidea del brazo izq a partir de los 18 meses.	Alergia al huevo, Guillain Barre por vacuna previa y Fiebre $>38.5^{\circ}\text{C}$	Fiebre y mialgia	A partir de los 6 meses (dosis anual)
Triple Viral SRP	0.5 ml	Vía subcutánea en la región deltoidea del brazo izquierdo	Inmunodeficiencia, fiebre $>38.5^{\circ}\text{C}$, enf. neurológica, TB s/tx, transfusión o que reciben IG esperar 3-11 meses.	Fiebre, rash, cefalea, parotiditis, meningitis, púrpura	12 y 18 meses
DPT	0.5 ml	Vía intramuscular en la región deltoidea o tricipital del brazo izquierdo	Anafilaxia, encefalopatía, enf. neurológica progresiva, crisis convulsivas.	Fiebre y síntomas locales.	4 años