

Ictericia neonatal

Nombre	Fisiologica	Por lactancia materna	Incompatibilidad ABO	Incompatibilidad RH
Causa	- Producción aumentada de bilirrubina - Inmadurez hepática - > reabsorción intestinal de bilirrubina - Prematurez	- Aumento de la reabsorción de la bilirrubina - Inhibidores de la glucoronitransferasa en la leche materna	- Madre con grupo sanguíneo O - Bebé con grupo A o B - Producción por mamá de Anti IgG Anti-A o Anti-B	- Incompatibilidad RH mamá y feto - Destrucción de glóbulos rojos en el feto
Sintomatología	- Letargo - Falta de apetito - Irritabilidad - Dificultad para respirar - Fiebre	- Coloración amarillenta de piel y ojos - Orina oscura - Heces pálidas - Somnolencia - Perdido de apetito	- Color amarillo - Pálidez - Hepatoesplenomegalia - Orina oscura - Letargo - Kernicterus - Hipotenia - Llanto agudo - Dificultad para succionar	- Progresión rápida de ictericia - Anemia hemolítica - Hepatomegalia - Hidropsia fetal - Dificultad para alimentarse
Días de aparición	2-3 días	4-7 días	Primeros 24 horas	Grave 24 hrs. Moderado de 48-72 hrs.
Tratamiento	No se necesita tratamiento - Alimentación frecuente - Monitoreo Fototerapia = Ex riesgo Edad Peso al nacer.	- Continuar con LM - Monitorear niveles de bilirrubina - Fototerapia en algunos casos.	Fototerapia 1ª línea Imunoglobulina intravascular	- Fototerapia intensiva - Imunoglobulina IV - Prevención con inmunoglobulina anti-D a la madre Rh negativa después del embarazo.