

Marvin López Roblero

DR. López Gutiérrez Karla Sofia

Pediatría

Cuadro comparativo

6°

“B”

Nombre	Días de aparición	signos	causa	Tratamiento
Ictericia Neonatal	1 - 24 hrs	color Amarillento en piel y mucosas, Deshidratación	se presenta debido a la corta vida media de los eritrocitos, a una concentración alta de eritrocitos y al lento metabolismo y excreción de la bilirrubina.	- Fototerapia - exanguino transfusión - inmunoglobulina intravenosa
Ictericia Asociada a la lactancia Materna	Después del 7º día de vida	Color Amarillento en piel y mucosas, Deshidratación.	se desconoce la causa exacta pero en algunos casos la leche materna contiene una glucoronidasa que podría ser la responsable de la ictericia	La fototerapia puede resultar beneficiosa. Las tomas frecuentes y los suplementos con fórmula o con leche materna extraída son mas convenientes si la ingesta parece no ser la adecuada o con pérdida de peso excesiva
Incompatibilidad Rh	6 horas de vida	• Anemia • hepatomegalia • esplenomegalia • palidez • cardiomegalia • dificultad respiratoria • Anasarca	transfusión por error de sangre Rh+ a una mujer Rh- . formación del antiwporon anti-D en la madre Rh(-) receptora y no sensibilizada.	Tratamiento del feto: • transfusión intrauterina • transfusión intravascular directa tx del RN vivo: • Exanguinotransfusión • inmunoglobulina intravenosa

Nombre	Días de aparición	signos	causas	Tratamiento
Incompatibilidad ABO	Primeras 24 horas	ictericia	Se pueden formar anticuerpos maternos contra las células B si la madre pertenece al grupo A, o contra las células A si la madre pertenece al grupo B. La madre suele ser del grupo O y el niño del grupo A o B.	- fototerapia - casos graves: administración de IgIV - exanguino transfusión