

**Nombre del alumno: Yereni
Montserrat Perez Nuricumbo**

**Nombre del profesor: Karla Sofía
López Gutiérrez**

**Nombre del trabajo: Cuadro
Comparativo**

Materia: Pediatría

Grado: 6

Grupo: B

Vacuna	Edad	Dosis	Vía de administración	Efectos Adversos	Contraindicaciones.
BCG (Evita Tb, meningea).	Al Nacimiento	0.1ml	Intradermica	pápula que se ulcera y causa cicatriz (90-95%)	SIDA, Tx. Inmunosupresor, leucemia, neoplasias o inmunodeficiencia.
Hepatitis B	Al Nacimiento	0.5 ml	Intramuscular	Fiebre, Fatiga. Ex. Gastrointestinales.	Fiebre >38.5 °C. Hipersensibilidad.
Hexavalente acelular (Difteria, tos ferina, tetano, polio, hepB, H. Influenzae, T.B).	2 meses 4 meses 16 meses 18 meses.	0.5	Intramuscular.	Enrojecimiento, dolor en el lugar de la inyección. - fiebre y irritabilidad	- Reacción alérgica - Enf. Aguda grave. - Encefalopatía previa.
Antirrotavirus.	2 meses a 4 meses	1.5ml	oral	Síntomas gastrointestinales, Fiebre, irritabilidad	Alergia al latex, antecedentes de intususcepción, malformaciones congénitas no corregidos del tracto GI.
Neumocócica conjugada	2(m), 4(m), 12(m)	0.5ml	Intramuscular	Eritema, dolor, induración, fiebre e irritabilidad	Fiebre >38.5 Hipersensibilidad.
Anti influenza	6 meses de edad a 5 años. Adultos >60 años.	0.5	Intramuscular	Fiebre y mialgia	Alergia al huevo, Guillain Baré, Por vacuna previa y Fiebre >38.5 °C.
Triple Viral SRP	① 0: 12m Edad ② 0: 18m NAC. A. Julio.	0.5	Subcutanea	Fiebre, rash, cefalea parotiditis, meningitis, Púrpura.	Inmunodeficiencia, Fiebre >38.5 °C, enf. Neurológicas, TB. 3/4x. Transfusión o que reúben 16. Esperar 3-11 meses
DPT	① Dosis = 2 meses ② = 4 meses. ③ = 6 meses 1er refuerzo = 15 y 18m 2 = 4 y 6 años	0.5ml	Intramuscular	Fiebre y síntomas locales.	Anafilaxia, encefalopatía, enf. Neurológica progresiva, crisis convulsivas.
					Alergia al huevo, Guillain