

SEXTO SEMESTRE GRUPO B

**TEMA: CUADRO INFORMATIVO TRABAJO DE PARTO Y
CONTROL PRENATAL**

MATERIA: GINECOLOGIA

**CATEDRATICA: ARELY ALEJANDRA
AGUILAR VELASCO**

**ALUMNO:
PABLO ADOLFO JIMENEZ VAZQUEZ**

CUADRO INFORMATIVO CONTROL PRENATAL

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
<p>Paraclínicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hemograma. • Hemoclasificación. • Glicemia en ayunas. • Uroanálisis. • Tamizaje para sífilis. • Tamizaje para VIH. • Anticuerpos IgG para toxoplasmosis. • Anticuerpos Anti-Hepatitis B. • Tamizaje para Rubeola (antes de la semana 16). 	<p>Paraclínicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hemograma. • Glicemia en ayunas. • Prueba de tolerancia a la glucosa (semana 24 a 28). • Uroanálisis. • Tamizaje para sífilis. • Urocultivo y Antibiograma (semana 16). • Anticuerpos IgG para toxoplasmosis. • Citología cérvico – vaginal. • Tamizaje genético: Trisomía 21, 18 y 13 (semana 12). 	<p>Paraclínicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hemograma. • Uroanálisis. • Tamizaje para sífilis. • Tamizaje para VIH. • Tamizaje para malaria (en zonas endémicas), semana 26, 32 y 36. • Tamización para Estreptococo del Grupo B (semanas 35 a 37), con cultivo rectal y vaginal. • Coombs indirecto (semana 28). • Anticuerpos IgG para toxoplasmosis.
<p>Ecografía (10 semanas + 6 días y 13 semanas+ 6 días).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mejorar la evaluación de la edad gestacional utilizando la longitud cefalocaudal fetal. • Detectar precozmente los embarazos múltiples. • Detectar algunas malformaciones fetales. 	<p>Ecografía de detalle (semana 18 y semana 23+6 días).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Detección de anomalías estructurales. <p>Ecografía (no se recomiendan de forma rutinaria después de la semana 24).</p>	<p>Ecografía (no se recomiendan de forma rutinaria después de la semana 24). Se deben realizar según criterio médico.</p>
<p>Vacunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Influenza estacional. • Tétanos (pacientes que nunca han recibido la vacuna), primera dosis en el primer control. • Fiebre amarilla, solo si la paciente va a viajar a zonas endémicas. • No se recomienda vacuna Hepatitis B. 	<p>Vacunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tétanos (pacientes que nunca han recibido la vacuna), segunda dosis a las 4 semanas. • Fiebre amarilla, solo si la paciente va a viajar a zonas endémicas. • Vacuna de la Bordetella Pertusis (semana 20). 	<p>Vacunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tétanos (pacientes que nunca han recibido la vacuna), tercera dosis de 6 a 12 meses de la dosis inicial. • Fiebre amarilla, solo si la paciente va a viajar a zonas endémicas.