



**HATZIRY GOMEZ HERNANDEZ**

**Dr. ROMEO ANTONIO MOLINA ROMÁN**

**MEDICINA PALIATIVA**

**MAPAS: CAQUEXIA Y ANOREXIA**

**6°**

**“B”**



Comitán de Domínguez Chiapas a

07 DE MARZO del 2025

# CAQUEXIA Y ANOREXIA

## CAQUEXIA

síndrome metabólico complejo caracterizado por una pérdida extrema de peso, masa muscular y grasa corporal, que no se puede revertir con una dieta convencional.

### Causas

- Cáncer.
- Enfermedades cardiovasculares.
- Enfermedades pulmonares crónicas.
- Insuficiencia renal.
- Infecciones crónicas, como el VIH/SIDA y la tuberculosis.
- Enfermedades autoinmunes y neurológicas

### Síntomas

- Pérdida de peso significativa.
- Pérdida de masa muscular.
- Fatiga y debilidad extrema.
- Pérdida de apetito.
- Anemia.
- Disminución de la actividad del sistema inmunológico
- Náuseas y mala absorción intestinal.

### TX

- Soporte Nutricional, Ejercicio Físico, Medicamentos: Hormonas, antiinflamatorios y esteroides, Apoyo Psicológico.



## ANOREXIA

Síntoma común en pacientes que reciben cuidados paliativos, especialmente aquellos con enfermedades avanzadas como el cáncer.

### Causas

Enfermedad Subyacente, Tratamientos Médicos: La quimioterapia, la radioterapia y otros tratamientos pueden causar náuseas, vómitos y cambios en el gusto, Factores Psicológicos.

### TX

- Soporte Nutricional
- Medicamentos
- Apoyo Psicológico,
- Cuidados Paliativos Integrales

- Anorexia-caquexia para-neoplásica oscila entre el 20-40% en la fase diagnóstica y entre el 70-80% en la fase avanzada de la enfermedad.
- Frecuente en pacientes con cáncer avanzado

ACETATO MAGESTROL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DOSIS: 80-800 MG/DÍA</li> <li>• ESTIMULANTE DEL APETITO Y GANANCIA DE PESO PRINCIPALMENTE EN MASA GRASA</li> <li>• EFECTIVIDAD: 80%</li> <li>• EFECTOS SECUNDARIOS: DISMINUYE NAÚSEAS Y VÓMITOS. SE ASOCIA A AUMENTO DE INCIDENCIAS DE TVP.</li> </ul>
CORTICOIDES DEXAMETASONA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DOSIS: 2-4 MG CADA 12 HRS</li> <li>• EFECTO DE CORTA DURACIÓN ( NO INDICADO EN MÁS DE 4 SEMANAS)</li> <li>• EFECTOS SECUNDARIOS: INTOLERANCIA A LA GLUCOSA, INFECCIONES Y EVENTUALMENTE PSICOSIS Y EUFORÍA.</li> </ul>
CRIPHEPTADINA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DOSIS: 4 MG CADA 8 HRS</li> <li>• ESTIMULANTE DEL APETITO</li> <li>• EFECTOS SECUNDARIOS: RESEQUEDAD DE BOCA, SOMNOLENCIA E INFRECUENTEMENTE ATAXIA.</li> </ul>