



Esmeralda Jiménez Jiménez

DR. Romeo Antonio Molina Román

Cuadro comparativo de Diarrea

Medicina Paliativa

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 6°

Grupo: B

Comitán de Domínguez Chiapas a 5 Abril de 2025

Nombre	Definición	Factores de riesgo	Cuadro clínico	Tratamiento
<i>Diarrea</i>	Es el aumento de la frecuencia acompañado de alteración de la consistencia de las deposiciones	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Exposición a virus, bacterias o parásitos ▪ Consumo de agua y alimentos contaminados ▪ Práctica inadecuada de lavado de manos ▪ Manipulación inadecuada de alimentos ▪ Inadecuada higiene personal, familiar, comunitaria y hogar 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Deshidratación ➤ Dolor o calambres estomacales ➤ Distensión estomacal ➤ Náuseas ➤ Vómitos ➤ Fiebre ➤ Necesidad urgente de defecar 	<ul style="list-style-type: none"> - Suspender laxantes - Loperamida: 1 comprimido ó 12-30 gotas después de cada deposición diarreica, máximo 6 veces al día

BIBLIOGRAFIA

LIBRO: Medicina Palitiva I

<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/diarrhoeal-disease>