



Claudia Patricia Abarca Jiménez

Dr. Romeo Antonio Molina Román

mapa

Medicina paliativa

PASIÓN POR EDUCAR

6°

“B”

Comitán de Domínguez Chiapas a 3 de marzo del 2025.

CONSTIPACION

DEFINICION

Trastorno digestivo que se caracteriza por la dificultad para evacuar

50-95%

Sintomas secundarios severos

EPIDEMIOLOGIA

34% de la población se consideraba estreñida.

a 33,5% en adultos mayores

ETIOLOGIA

Invasión intestinal

sedentarismo

Anticolinérgicos

Fecaloma

Patologías subyacentes

neurologico

Baja ingesta de líquidos

opioides

Antidepresivo

CLINICA

Menos de tres evacuaciones por semana

Heces duras, secas o grumosas

Dolor o esfuerzo al defecar

tenesmo

Pseudodiarrea

Retencion urinaria

DIAGNOSTICO

Rx abdomen simple

PUNTAJE

0= sin heces
1 = heces ocupando menos del 50%
2 = heces ocupando más del 50%
3 = heces ocupando el 100%

TRATAMIENTO

PSILLIUM 3gr c/8hrs

BISACODILO. 5mg día

DOCUSATO. Emoliente

LACTULOSA