



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE
COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS**



SEXTO SEMESTRE GRUPO B

VIH/SIDA

MATERIA: ENFERMEDADES INFECCIOSAS

CATEDRATICO: DR. ADOLFO BRAYAN MEDELLIN

ALUMNO:

PABLO ADOLFO JIMENEZ VAZQUEZ

VIIH

Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida

¿Qué es el VIH?

Conjunto de manifestaciones clínicas que aparecen como consecuencias de la depresión del sistema inmunológico

Debido a infección por el virus de la inmunodeficiencia humana

Infección VIH

Una persona infectada va perdiendo de forma progresiva, la función de ciertas células del sistema inmune llamadas linfocitos TCD4

Desarrollando ciertos tipos de tumores y infecciones

Prevención

Modo de Transmisión

Contagio por vía sexual

Contagio por vía sanguínea

Contagio de madre a hijo

Usar preservativos en el acto sexual (condón)

Usar jeringas desechables y no compartirlas con otras personas, para evitar un posible contagio

Portador del VIH

Conviene recordar que la infección del VIH no implican necesariamente que la persona portadora vaya a desarrollar la enfermedad. En esta fase el individuo se considera "seropositivo" o portador.

El portador puede vivir más de 10 años con el virus del VIH-Es recomendable usar un tratamiento

Después de estos múltiples desaparecen durante dos semanas aproximadamente

Desarrollo de la enfermedad

La persona infectada va perdiendo el funcionamiento de las células, principal referencia para catalogar el estado de evolución de la enfermedad. Alrededor de tres semanas después de la infección por el VIH y la mayoría de los pacientes presentan los síntomas: fiebre, Cefalea, entumecimiento, linfadenopatía y sensación de molestias