



Ana Kristell Gómez Castillo.

Dr. Adolfo Medellín Guillen.

Cuadro Comparativo.

Enfermedades infecciosas.

6 "B"

PASIÓN POR EDUCAR

Comitán de Domínguez Chiapas. A 23 de Mayo, 2025.

CUADRO COMPARATIVO

Patología.	Dengue	Chikungunya	Zika
Definición	Enfermedad infecciosa causada por un virus del género flavivirus, transmitido principalmente por picadura de mosquitos.	Significa doblarse o encovarse.	Flavivirus que puede causar una enfermedad febril aguda en humanos. Asociada a enfermedades neurológicas congénitas.
Agente Etiológico	Virus del dengue: DENV-1 DENV-2 DENV-3 y DENV 4.	Virus del Chikungunya (V'CHIK) ARN, género Arfarivirus, familia Togaviridae	Virus del Zika género flavivirus que se transmite principalmente a través de la picadura de mosquitos transmisores.
Vector	Aedes Aegypti Aedes albopictus, hembras	• Aedes Aegypti y • Aedes albopictus	• Aedes Aegypti • Aedes albopictus
Cuadro Clínico.	Fiebre del 1 a 5º día + 2 de los sig. síntomas: - Náuseas/vómitos - Exantema - Mialgias/artralgias - Ceja caída /doble retinaocular.	Aguda: 3-10 días. Fiebre inicio súbito >39°C Artralgia severa. Subaguda: 2 a 3 meses crónica: >3 meses y puede hasta 18 meses.	Exantema maculo-papular Fiebre 38-39°C Conjuntivitis no purulenta / hiperemia. Mialgias/artralgias
Clasificación	- Dengue con signos de alarma - Dengue sin signos de alarma - Dengue grave.	Agudo 3 a 10 días. Subagudo 2 a 3 meses Crónico: >3 meses	

CUADRO COMPARATIVO

	Dengue	Chikungunya.	ZIKA
Diagnostico	<p>Clinica + RT - qPCR Triplex</p> <p>Clinica + antígeno NS1</p> <p>Sob bite confirmado por triplex</p> <p>IgM (a partir del 6 día)</p>	<p>RT - PCR de ARN viral</p> <p>durante los primeros 5 días.</p> <p>IgM a los 6 días de la fiebre.</p>	<p>Sintomas: Exantema, fiebre, conjuntivitis no purulenta, mialgias</p> <p>Factor epidemiológico (sexual)</p> <p>Positivo zIKV por PCR de ARN viral.</p>
Tratamiento	<ul style="list-style-type: none"> - Sintomático en dengue sin signos de alarma, medios físicos y paracetamol - (Único antiinflamatorio autorizado). 	<ul style="list-style-type: none"> - Sintomático, reposo en cama - Medios físicos y paracetamol - Fase subaguda: AINEs para artalgias - Prohibido: Oxido de cinc. 	<p>No hay medicamento específico.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medidas generales - Hidratación - Reposo
Consideraciones especiales	<ul style="list-style-type: none"> - Embarazadas: Hospitalizar - Pediátricos - Diabetes gestacional - Adultos mayores 		

REFERENCIA

Guía para el diagnóstico, tratamiento y prevención de dengue. GPC. 2015.