

Diego Caballero Bonifaz

DR: Erik Adolfo Medellín Guillen

Cuadro comparativo

Enfermedades infecciosas

6

B

PASIÓN POR EDUCAR

Dengue Definición: Enfermedad viral sistémica y dinámica transmitida por vectores.	Zika Definición Virus transmitida e por mosquitos se identificó por primera vez en un macaco	Chinkunkuya significa doblarse o encorvarse infecciosa y vectorial
Agente etiológico: Virus del dengue flavivirus - DENV1 - DENV2 - DENV3 - DENV4	Agente etiológico Virus del zika carbovirus, género flavivirus familia viridae	Agente etiológico Virus Chinkunguya (VCHIK) ARN, género Alfavirus familia togaviridae
Vector Aedes aegypti y Aedes albopictus	Vector Aedes aegypti	Vector Aedes aegypti Aedes albopictus
Clasificación - Choque por extravasación - Sangrado profuso - Dengue sin signos alarma - Dengue con signos alarma - Dengue grave	Clasificación	Clasificación
Cuadro Clínico Fiebre aguda inicio súbita 1-5 días - Náuseas - Leucopenia - Exantema - Prueba torniquete - Mialgias/artralgias - Cefalea - Petequeas	Cuadro clínico Exantema a maculo papular 3-5 días después fiebre - Cefalea - conjuntivitis - Conjuntivitis - Mialgias/artroalgias - Prurito - Dolor retroocular	Cuadro clínico Fiebre 38 a 39 - Exantema - Conjuntivitis - Artralgias - Mialgias - Artritis inflamatoria - Cefalea
Diagnostico - Clínica NSI (5 días brotes) - RT-QPCR triple (5 días) - IgM 6 días	Diagnostico Probable: exantema + fiebre, artralgia, cefalea conjuntivitis Confirmado: PCR 5 días	Diagnostico Fiebre PROBABLE: fiebre + asociación epidemiológica Caso confirmado: PCR de ARN viral 5 días y IGM 6 días
Tratamiento Grupo A Reposo en cama, pabellón Grupo B Reposición líquidos cristaloides IV - Evaluar hematocrito con soluciones coloides - Paracetamol e hidratación esenciales para manejo ambulatorio Consideraciones especiales Embarazadas: deben de ser hospitalizadas con sol. salina 0.9% - Evitar cesarea, procedimiento o maniobras quirúrgicas - No usar soluciones glucosadas Pediatricos: RN de madre debe ser vigilados - No suspender lactancia materna y soluciones orales - Uso paracetamol	Tratamiento - Alivio síntomas, reposo abundante y antihistaminicos	Tratamiento Medios físicos, no se recomienda uso de AINES óxido de zinc y antihistaminicos