



Esmeralda Jiménez Jiménez

DR MEDELLIN GUILLEN ADOLFO

Cuadro comparativo

PASIÓN POR EDUCAR

Enfermedades Infecciosas

Grado: 6°

Grupo: B

Comitán de Domínguez Chiapas a 23 de mayo 2025

Patogenia	DENGUE	ZIKA	CHIKUNGUNYA																								
Definición	Enf. Infecciosa viral con serotipos 1, 2, 3, 4 sistémica y dinámica	Período de incubación 3-12 días Virus transmitido por mosquitos	Enf. Viral transmitida por mosquitos P. Incubación 1-12 días																								
Vector	Aedes Aegypti y Albopictus	Aedes Aegypti	Aedes Aegypti y Albopictus																								
Agente Etiológico	Fam. Flaviviridae, Arbovirus	Familia Flaviviridae Genero Flavivirus arbovirus	Familia Togaviridae Alfa virus																								
Cuadro Clínico	<p>Sin signos de alarma</p> <ul style="list-style-type: none"> Fiebre / rascos / vomito / exantema / mialgias / artralgias / petecias <p>Con signos de alarma</p> <ul style="list-style-type: none"> Dolor abdominal / vómito persistente / acumulación de líquido / sangrado mucosas / letargo / irritabilidad <p>Grave</p> <ul style="list-style-type: none"> Shock / dif. resp. / hemorragia grave / daño en órganos / acumulación de líquido 	<ul style="list-style-type: none"> Fiebre leve Conjuntivitis Debilidad muscular Salpicado Inflamación de pies y manos Dolor de cabeza Menos frecuencia de vómito / diarrea 	<p>Exantema - Eritema maculopapular de tronco y extremidades</p> <ul style="list-style-type: none"> Cefalea Lumbalgia Conjuntivitis Mialgias Náuseas / vómito Fiebre > 39°C 																								
Clasificación	<ul style="list-style-type: none"> Dengue sin datos de alarma Dengue con datos de alarma Dengue grave 	No tiene	<p>Aguda: 3-10 días</p> <p>Subaguda: 2-3 meses post infección</p> <p>Crónica: > 3 meses - 18 meses o 3 años</p>																								
Diagnóstico	<table border="0"> <tr> <td>Fase febril</td> <td>Fase de recuperación</td> <td>Fase crítica</td> </tr> <tr> <td>• B-Hisagorina</td> <td>• 2hs</td> <td>• 48-72 hrs</td> </tr> <tr> <td>• Inicial</td> <td>• B-Hisagorina</td> <td>• Dengue</td> </tr> <tr> <td>• 2-3 días</td> <td>• Hematocrito ↓</td> <td>• Hidroelectrolitos</td> </tr> <tr> <td>• Fiebre + (38.5)</td> <td>• Trombocitopenia</td> <td>• Litio + ácido</td> </tr> <tr> <td>• 38-40°C</td> <td>• TPE / PT normal</td> <td>• Base</td> </tr> <tr> <td>• > 6 días = IgM</td> <td>• Transaminasas ↑</td> <td>• lactato ↑</td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Albúmina BILIRUBIN</td> <td></td> </tr> </table>	Fase febril	Fase de recuperación	Fase crítica	• B-Hisagorina	• 2hs	• 48-72 hrs	• Inicial	• B-Hisagorina	• Dengue	• 2-3 días	• Hematocrito ↓	• Hidroelectrolitos	• Fiebre + (38.5)	• Trombocitopenia	• Litio + ácido	• 38-40°C	• TPE / PT normal	• Base	• > 6 días = IgM	• Transaminasas ↑	• lactato ↑		• Albúmina BILIRUBIN		<p>PCR - RT de ARN viral en los primeros 5 días.</p> <p>> 6 días anticuerpos IgM clínica</p>	<p>RT-PCR de ARN viral en los primeros 5 días</p> <p>> 6 días anticuerpos IgM clínica</p>
Fase febril	Fase de recuperación	Fase crítica																									
• B-Hisagorina	• 2hs	• 48-72 hrs																									
• Inicial	• B-Hisagorina	• Dengue																									
• 2-3 días	• Hematocrito ↓	• Hidroelectrolitos																									
• Fiebre + (38.5)	• Trombocitopenia	• Litio + ácido																									
• 38-40°C	• TPE / PT normal	• Base																									
• > 6 días = IgM	• Transaminasas ↑	• lactato ↑																									
	• Albúmina BILIRUBIN																										
Tratamiento	<table border="0"> <tr> <td>Fase febril</td> <td>Fase de recuperación</td> <td>Fase crítica</td> </tr> <tr> <td>• Sintomático</td> <td>• Hospitalización</td> <td>• VC /</td> </tr> <tr> <td>• Paracetamol</td> <td>• 2-3 días</td> <td>• Solución</td> </tr> <tr> <td>• Soporte</td> <td>• Líquido VO</td> <td>• Pérdida</td> </tr> <tr> <td>• Hidratación</td> <td>• d 10</td> <td>• Signos</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>• soporte</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>• Hem</td> </tr> </table>	Fase febril	Fase de recuperación	Fase crítica	• Sintomático	• Hospitalización	• VC /	• Paracetamol	• 2-3 días	• Solución	• Soporte	• Líquido VO	• Pérdida	• Hidratación	• d 10	• Signos			• soporte			• Hem	<p>Sintomático - Fiebre - Paracetamol</p> <p>Punto de erupción abona → Obede zinc antiinflamatorio</p> <p>Medidas físicas</p>	<p>Hidratación</p> <p>ANES > 7 días de analgesia en fase subaguda</p> <p>Medidas físicas</p> <p>Sintomático - Fiebre Paracetamol</p>			
Fase febril	Fase de recuperación	Fase crítica																									
• Sintomático	• Hospitalización	• VC /																									
• Paracetamol	• 2-3 días	• Solución																									
• Soporte	• Líquido VO	• Pérdida																									
• Hidratación	• d 10	• Signos																									
		• soporte																									
		• Hem																									
Consideraciones	<ul style="list-style-type: none"> Adultos Mayores Embarazadas DM Ins renal HAS 	<p>Sr Guillen Barre</p> <p>Plicencefalía → Bebo</p> <p>Principal complicación en Mujeres Embarazadas</p>	<p>Principal Complicación en Embarazadas</p> <p>Sr Guillen Barre</p>																								