



Emmanuel Hernández Domínguez

Dr. Adolfo Medellín Guillen

Cuadro comparativo

Enfermedades infecciosas

6-B

Comitán de Domínguez Chiapas a 23 de mayo de 2025.

	DENGUE	ZIKA	CHIKUNGUNYA
Definición	Enfermedad infecciosa viral sistémica y dinámica, transmitida por el vector <i>A. aegypti</i> y <i>A. albopictus</i> .	Enfermedad infecciosa causada por ZIKV, transmitida por mosquito del género <i>Aedes</i> .	Infección por CHIKV que causa enfermedad febril, ocasionada por un alfavirus ARN de la familia <i>Togaviridae</i> .
Agente etiológico	Virus del dengue (DENV1, 2, 3 y 4)	Virus del zika	Virus del chikungunya
Vector	<i>Aedes aegypti</i> y <i>aedes albopictus</i>	<i>Aedes aegypti</i>	<i>Aedes aegypti</i> y <i>aedes albopictus</i>
Clasificación	• D. sin signos de alarma. • D. con signos de a. • Dengue grave		
Cuadro clínico	• Fiebre del ter-5to día • Náuseas / vómito • Mialgias / artalgias • Cefalea / dolor retro-ocular • Petequias • Leucopenia • Exantema	• Exantema 3er-5to día después de inicio de la fiebre • Fiebre (38-39°) • Cefalea • Conjuntivitis • Artralgias / mialgias • Edema periartricular • Prurito • Dolor retroocular	• Fiebre de inicio súbito (>39°) • Artralgia severa y limitante poliartricular, simétrica distal. • Eritema maculo-papular de tronco y ext. • Cefalea, lumbalgia y mialgias • Náuseas / vómito • Conjuntivitis
Diagnóstico	• Clínica + RT-qPCR Triplex (Primeros 5 días) • Clínica + Ag NS1 (Primeros 5 días) solo bato conf. por triplex • IgM (a partir de 6 día)	• Clínica • PCR de ARN viral en los primeros 5 días.	• Clínica • RT-PCR de ARN viral (primeros 5 días) • IgM a los 6 días de inicio de fiebre
Tratamiento	• Sintomático en DSSA • Grupo A: Reposo en cama y pabellón. Fiebre + artalgias: Medios físicos y paracetamol. Líquido VO. • Grupo B y C: Hospitalizar con reposición de líquidos críbridos IV	• Sintomático, reposo en cama • Fiebre: Medios físicos y paracetamol. No AINES en fase aguda (indicar pasados 7 días) • Fase subaguda: AINES para tx de artalgias.	• Sintomático, reposo en cama • Fiebre: Medios físicos y paracetamol. No AINES en fase aguda • Fase subaguda: AINES para tx de artalgias
Consideraciones especiales	• Embarazadas • Pediátricos • Comorbilidad • Adulto mayor		

Bibliografía

CENETEC. (2016). Clasificación, diagnóstico y tratamiento integral del dengue. Obtenido de GPC: <https://www.cenetec-difusion.com/CMGPC/SS-151-08/ER.pdf>