



Oscar Eduardo Guillén Sánchez

Dr. Adolfo Medellín Guillén

Enfermedades Infecciosas

Cuadro comparativo

6to

“B”

Comitán de Domínguez Chiapas a 23 de mayo del 2025

Dengue

Virus del dengue. <sup>Enf. infecciosa
viral sistémica
y dinámica</sup>
(Flavivirus)

Principal = Aedes aegypti
Aedes albopictus

P. Incubación de 3-14 días.

Clinica....

- > Náuseas y vómito
- > Mialgias / Artralgias
- > Cefalea y retro-ocular
- > Erupción
- > Petequias.
- > Fiebre 1° al 5° día
- > Trombocitopenia

Duración de síntomas de
5-7 días (puede prolongarse +
en casos graves).

Diagnóstico.... + clínica.
> Prueba serológica (EISA)
> PCR
> NS1 > IgM (a partir del día 6).

Se realiza un tratamiento sintomático,
hidratación, reposo, Paracetamol, Evitar
hemorragias.
(NO ASPIRINA)

Se puede reconocer complicaciones
como Dengue grave, hemorragia y
shock.

Zika

Virus del Zika
(Flavivirus)

Principal = Aedes aegypti
Aedes albopictus

P. Incubación 3-12 días.

Clinica....
> Contacto sexual 2 semanas
previos a sintomatología.
> Erantema (Maculo-papular pruriginoso) 3°-5° día
> Cefalea
> Conjuntivitis (no purulenta / hiperemia)
> Fiebre 38-39°C
> Dolor retro-ocular
> Artralgia / mialgia.

Duración de síntomas de
2-7 días.

> Positivo a Zika por PCR
de ARN viral en los
primeros 5 días del cuadro clínico

tratamiento sintomático, reposo,
hidratación (Paracetamol)

Complicaciones como:

- > Sí de Guillain-Barré
- > Hipoacusia / sordera
- > Malformaciones congénitas
- > Anomalia ocular.
- > microcefalia
- > bajo peso al

Chikungunya

Virus del Chikungunya
(Alphavirus).

Principal = Aedes aegypti
Aedes albopictus.

P. Incubación 1-12 días

Aguda 3-10 días
> Fiebre súbita 39°C
> Artralgia severa y
limitante poliarticular.
> Eritema maculo-papular
> Cefalea, lumbalgia, náuseas.
Sobresada
2-3 meses post-
infección
Crónica
> 3 meses hasta
18 meses e incluso 3 años.

Duración de síntomas de
7-10 días.
(Dolor articular hasta 4 meses)

> Diagnóstico....
RT-PCR de ARN viral durante 5 días.
IgM a los 6 días de Fiebre.
Primero.

Tratamiento sintomático,
> Dado de zinc y antihistamínicos
> Fase sobresada → AINES
> Fase aguda → NO se recomienda AINES.

> Dolor articular crónico
> Artrosis Prolongada