



Nombre del alumno: Karina Montserrat Méndez Lara.

Nombre del profesor: Jesús Eduardo Cruz Domínguez.

Nombre del trabajo: Cuadro sinóptico.

Materia: Geriatria.

Grado: 6

Grupo: "C"

DIABETES MELLITUS 2

Definición

Trastorno metabólico caracterizado por hiperglucemia debido a un deterioro en la secreción o acción de la insulina

Epidemiología

- Mayor prevalencia en mujeres >60 años
- Segunda causa de muerte en México

Clínica

- Síntomas clásicos
 - Poliuria
 - Polidipsia
 - Polifagia
 - Pérdida de peso
- Síntomas inespecíficos
 - Fatiga
 - Irritabilidad
 - Anorexia

DX

- Glucosa en ayuno
- Hemoglobina glucosilada
- Glucosa plasmática a las 2 horas (>200 mg/dl)
- Síntomas de hiperglucemia + glucemia >200 mg/dl en cualquier momento
- Tamizaje: FINDRISC, ADA

Tx

- No farmacológico
 - Estilo de vida saludable
 - Dieta mediterránea
 - Control de salud bucal
- Farmacológico
 - Primera línea: Metformina.
 - Alternativas: Inhibidores de DPP-4

Complicación

- Gangrena de Fournier:
- Infección rápidamente progresiva de los tejidos blandos en la región perineal, escrotal y genital, con alta mortalidad