



Karen Guadalupe Alvarez de la Cruz.

Dr. Raúl de la Rosa Pacheco.

Cefaleas primarias.

Neurología.

Grado: 6

Grupo: C

Comitán de Domínguez Chiapas a 10 de abril del 2025.

	Definición	Características	Síntomas asociados	Epidemiología	Duración	Intensidad	Diagnostico	Tratamiento
Migraña	Trastorno neurológico que se caracteriza por dolor de cabeza recurrente.	Unilateral. Pulsátil. Empeora con la actividad física.	Nauseas Vomito Fotofobia Escotomas Fosfenos Acufenos	Mas frecuente en mujeres.	Dura de 4 a 72 hrs	Moderada a severa	Clínico	Paracetamol/ibuprofeno VO Paracetamol + metoclopramida 10 mg IV Zolmitriptan 2.5-5 mg sublingual
Cefalea en racimos	Dolor de cabeza intenso que se presenta en periodos de ataques frecuentes	Unilateral Periocular Predominio nocturno (hasta 8 ocasiones)	Rinorrea Lagrimeo Edema y ptosis palpebral Miosis	Mas frecuente en varones adultos Edad: 20 a 50 años	Dura de 15 a 180 min con un promedio de 45 min	Moderada a severa (más severa)	Clínico	Sumatriptan 50 a 100 mg Vo Aporte de O2 al 100% por 10-15 min
Cefalea tensional	Dolor de cabeza crónico, recurrente y de distribución holocraneal	Dolor bilateral Opresivo No empeora con la actividad física	No tiene síntomas asociados	Mas frecuente en mujeres Cefalea primaria más común	Dura de 30 min a 7 días	Leve a moderada	Clínico	Episódica: Paracetamol 1 gr AAS 100 a 150 mg Ibuprofeno 600 mg Crónica: Amitriptilina 12.5 mg nocturno, aumentar dosis semanal (12.5 mg) hasta 75 mg