

Nombre del alumno:

Evangelina Yaquelin Roblero Roblero

Nombre del profesor. Dr. Raúl de la Rosa Pacheco

Nombre del trabajo. EVC isquémico.

Materia: Neurología.

Grado: 6.

Grupo: "C"

EVC

Paciente con probable EVC isquémico

Descartar hipoglucemia, hipoxia y trauma

Si

No

Buscar otras causas

Evaluar escala de Cincinnati



Tubo uno o más puntos positivo

No

Buscar otras causas

Evaluar escala de NIHSS

ITEM	PARAMETRO	PUNTUACION
1	Nivel de Conciencia	0: alerta; 1: somnoliento; 2: aturdo; 3: coma
2	Orientación	0: responde a todas preguntas; 1: responde a una pregunta; 2: no responde preguntas
3	Respuesta a Órdenes	0: realiza ambas tareas; 1: realiza una tarea; 2: no realiza ninguna tarea
4	Parálisis	0: normal; 1: parálisis parcial de la mirada; 2: parálisis total de la mirada
5	Coma Visual	0: sin esfuerzo; 1: hemianopsia parcial; 2: hemianopsia homónima; 3: hemianopsia bilateral
6	Hemiparesia Facial	0: normal; 1: parálisis leve; 2: parálisis parcial; 3: parálisis completa
7	Parálisis Motora (Superior)	0: normal; 1: con lentitud en < 10 s; 2: algún esfuerzo contra la gravedad; 3: no hace esfuerzos contra la gravedad; 4: ningún movimiento; no puntúan amputados
8	Parálisis Motora (Inferior)	0: normal; 1: claudica en < 5 s; 2: algún esfuerzo contra gravedad; 3: no hace esfuerzos contra gravedad; 4: ningún movimiento; no puntúan amputados
9	Sensibilidad	0: normal; 1: presenta en una extremidad; 2: presenta en dos extremidades; no puntúan amputados
10	Lenguaje	0: normal; 1: defecto leve; 2: defecto total
11	Lenguaje	0: normal; 1: defecto moderado; 2: afasia grave; 3: afasia total
12	Ataxia	0: normal; 1: leve a moderado; 2: grave a severo; 3: parálisis; no puntúan amputados
13	Ataxia	0: normal; 1: afectación leve; 2: afectación severa

Solicitar una TAC

Neurología

Si

Se encuentran signos de EVC Hemorrágico

Valorar escala de ASPECTS

Buscar otras causas

Tiene un puntaje > 7

Trombolizar

Criterios de exclusión

- HAS (sistólica > 185 mmHg y diastólica > 110 mmHg)
- Aspect's • Úlcera
- Convulsiones
- Trastornos de la coagulación
- Escala de NIHSS < 4 > 25
- Edad > 85 años
- Neurocirugía < 3 meses
- TCE severo < 3 meses
- Cirugía general < 14 días
- Tx con anticoagulante
- Sangrado de tubo digestivo
- Trombocitopenia < 100,000

Tiene criterios de exclusión

No

Administrar:

- Alteplaza 0.9 mg/kg 10% en bolo y 90% para 1h
- Dosis máxima 90 mg
- Tenecteplaza 0.25 mg/kg en bolo
- Dosis máxima 25 mg

Pasar a UCI para medidas de neuroprotección

Mantener la camilla en 30-45 grados

- Glucosa ≤ 180 mg/dL - ≥ 80 mg/dL
- Hemoglobina 7-9 mg/dL
- Oxígeno 94-97%
- Sodio ≥ 135 mEq/L - < 155 mEq/L
- Temperatura < 38°C

Confort (control del dolor, ansiedad y estrés).

- Apresión arterial PAM ≥ 80 mmHg PPC ≥ 60 mmHg
- PCO2 evitar < 35 mmHg

Si

HAS

Trombolizar

Si

TA > 185/110

<

Si

En la 1ª hora disminuir la PAM en un 15% con:

- Labetalol 0.25 a 0.5 mg/kg Infusión 2-4 mg/min.
- Nifedipino 10-20 mg
- Nicardipino 5 mg/hora

Aumentar cada 15 minutos 2.5

PRIMEROS 10 MINUTOS

