



Nombre del alumno: Miguel Ángel Calvo Vazquez

Nombre del docente: Dr. Raúl de la Rosa Pacheco

Nombre de la actividad: Cuadro comparativo

Materia: Neurología

Semestre: 6°to

Grupo: "C"

Comitán de Domínguez Chiapas a 6 de abril del 2025.

CEFALEAS PRIMARIAS	DEFINICIÓN	CARACTERISTICAS	SINTOMAS ASOCIADOS	EPIDEMIOLOGIA	DURACIÓN	INTENSIDAD	DIAGNOSTICO	TRATAMIENTO
<b>Cefalea tensional</b>	Dolor de cabeza bilateral de tipo opresivo, no pulsátil, de intensidad leve a moderada	Episódica: Menor a 15 días, frecuente mayor a 10 días e infrecuente menor a 10 días Crónica: mayor a 15 días	No tiene signos y sintomas asociados	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La más común de todas las cefaleas</li> <li>• Mujeres</li> </ul>	De 30 minutos a varios días.	Leve-moderada	Clinico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspirina 150 mg</li> <li>• Ibuprofeno 600 mg</li> <li>• Paracetamol 1gr</li> <li>• Amitriptilina 12.5 mg hasta 75 mg</li> </ul>
<b>Migraña</b>	Trastorno neurológico caracterizado por cefalea episódica con o sin aura.	Unilateral, pulsátil , Migraña con aura y sin aura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acufenos</li> <li>• Fosfenos</li> <li>• Nauseas y vomito</li> <li>• Impide realizar Actividades fisicas</li> <li>• fotofobia y fonofobia</li> <li>• Escotomas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es mas común en mujeres</li> <li>• Migraña con aura se encuentra en un 25% y la migraña sin aura en un 75%</li> </ul>	4-72 horas	Moderada-severa	Clinico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hidratación</li> <li>• Metoclopramida 10 mg IV</li> <li>• Ibuprofeno 600 mg</li> <li>• Aspirina 150 mg</li> <li>• Paracetamol 1 gr</li> <li>• Zolmitriptano</li> </ul>
<b>Cefalea en racimos</b>	Trastorno neurológico con ataques recurrentes de dolor unilateral intenso en región orbitaria.	Solo unilateral Dolor en el ojo intenso Recurrencia nocturna Pulsatil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lagrimeo</li> <li>• rinorrea</li> <li>• edema palpebral</li> <li>• ptosis</li> <li>• miosis</li> <li>• inquietud motora.</li> </ul>	Más común en hombres entre 20 y 40 años	Ataques de 15 a 180 minutos, que pueden repetirse varias veces al día	Intenso	Clinico	Verapamilo 80 mg