



Karla Guadalupe Pérez Pérez


Dr. De la Rosa Pacheco Raúl

Manejo EVC isquémico



Neurología

6 "C"



TROMBOLITICOS

- EXCLUSION
- Tratamiento con anticoagulantes
 - Antecedentes de neurocirugía 3 meses
 - TCE severo menor de 3 meses
 - trombopenia
 - DM
 - Hipertension
 - Hemorragias
 - Sangrado activo
 - Convulsiones
 - ICTUS

Si NO SE PUEDE TROMBOLIZAR

- Aspirina 300 mg 100 mg cada 24 hrs
- atorvastatina 80 mg 40-80 mg cada 24 hrs
- clopidogrel 300 mg 100 a 150 mg



4 TROMBOEZAMOS

SI NO ESTA AFECTADO MÁS DE 1/3 DEL CEREBRO

Atleypasa 0.9 mg/kd 10% bolo
Tenecteplasa 90% lo pasamos en 1 hora 0.25 mg/kg dosis unica bolo

TIEMPO VENTANA 3 A 4.5 HORAS



GHOST CAP

- Glucosa: <180 mg/dl >80 mg/dl
- Hemoglobina 7-9 mg/dl
- Oxígeno 94-97%
- Sodio >135mEq/l <155mEq/l
- Temperatura <38 grados
- Confort control del dolor, ansiedad y estres
- Arterial Blood PAM >80 mmHg
- PCO2 35-38



CABECERA 30-45 GRADOS

5 MEDIDAS DE NEUROPROTECCIÓN

EVC

ISQUEMICO

3 VALPORAR SI SE PACIENTE SE TROMBOEIZA



>4 <25 TROMBOLIZAMOS

Escala NIHSS	
Escala a utilizar en todos los casos de EVC agudo	
Recomienda trombolisis con puntaje >4 y <25	
1. Nivel de conciencia	0-4
2. Atención	0-4
3. Fuerza motora izquierda	0-4
4. Fuerza motora derecha	0-4
5. Fuerza motora cara izquierda	0-4
6. Fuerza motora cara derecha	0-4
7. Fuerza motora brazo izquierdo	0-4
8. Fuerza motora brazo derecho	0-4
9. Fuerza motora pierna izquierda	0-4
10. Fuerza motora pierna derecha	0-4
11. Equilibrio	0-4
12. Lengaje	0-4
13. Visión	0-4
14. Atención	0-4
15. Memoria	0-4
16. Función motora	0-4
17. Función motora	0-4
18. Función motora	0-4
19. Función motora	0-4
20. Función motora	0-4
21. Función motora	0-4
22. Función motora	0-4
23. Función motora	0-4
24. Función motora	0-4
25. Función motora	0-4

1

10 MINUTOS

Tomar signos vitales
Descartar Diagnostico diferencial (hipoxemia administramos oxigeno) hipoglucemia




REALIZAR ESCALAS



2

20 MINUTOS



Tomografía

VALPORAR



CINCINNATI



1 PUNTO NOS INDICA EL 70% DE EVC

NIHSS

Escala NIHSS	
Escala a utilizar en todos los casos de EVC agudo	
Recomienda trombolisis con puntaje >4 y <25	
1. Nivel de conciencia	0-4
2. Atención	0-4
3. Fuerza motora izquierda	0-4
4. Fuerza motora derecha	0-4
5. Fuerza motora cara izquierda	0-4
6. Fuerza motora cara derecha	0-4
7. Fuerza motora brazo izquierdo	0-4
8. Fuerza motora brazo derecho	0-4
9. Fuerza motora pierna izquierda	0-4
10. Fuerza motora pierna derecha	0-4
11. Equilibrio	0-4
12. Lengaje	0-4
13. Visión	0-4
14. Atención	0-4
15. Memoria	0-4
16. Función motora	0-4
17. Función motora	0-4
18. Función motora	0-4
19. Función motora	0-4
20. Función motora	0-4
21. Función motora	0-4
22. Función motora	0-4
23. Función motora	0-4
24. Función motora	0-4
25. Función motora	0-4

Puntaje ASPECTS evaluación de EVC agudo



>7 SE TROMBOLIZA