

**Universidad del Sureste
Campus Comitán**

Licenciatura en Medicina Humana

**Actividad: Flujograma de manejo de EVC
isquémico**

Materia: Neurología

Docente: Dr Raul Pacheco de la Rosa


Alumno: Vázquez López Josué

5to "C"

Comitán de Domínguez Chiapas al día 30 de mayo del 2025



Paso 1



Paso 2

Utilizar

Escala de Cincinnati
para evaluación de probable EVC en el medio prehospitalario


- Desviación de la comisura labial (1 punto)
- Debilidad de extremidad superior (1 punto)
- Alteración en el habla (1 punto)

Spotlight: Si tan solo uno de estos es positivo, existe el 72% de probabilidad de que se trate de un EVC. Se debe de llamar inmediatamente a emergencias, ya que de confirmar el diagnóstico, el tx consiste en administración de rPA (si no está contraindicado) en las primeras 4,5 horas.

1 un punto se va a considera el pronóstico de 70% ECV

- Se observa;
- Una desviación los labios (1 punto)
 - Elevación de brazos por 10 segundos y si cae un es un (1 punto)
 - Pedir el px que repita una frase, presenta dificultad en pronunciar (1 punto)

Escala de NIHSS



escala de Aspects


- Zona: 4 puntos
- Zona: 7 puntos

Cuando


El criterio es >7 puntos

<7 punto de exclusión de trombolisis

Paso 3



Paso 4



Paso 5

