

**Nombre del alumno: Madrid Sánchez
Luis Jaime**

**Nombre del profesor: De la Rosa
Pacheco Raul**

**Nombre del trabajo: Cuadro
comparativo de cefaleas**

Materia: Neurología

Grado: Sexto semestre

Grupo: "C"

	CEFALEA TENSIONAL	MIGRAÑA	CEFALEA EN RACIMOS
DEFINICION	Cefalea primaria más comun	Dolor de cabeza recurrente que puede ser intenso y incapacitante	Dolor de cabeza intenso que se presenta en episodios frecuentes, conocidos como racimos
CARACTERISTICAS	Dolor bilateral Opresivo, no punsatil No presenta náuseas o vómito	Punsatil Unilateral	Predominio nocturno (45 min en promedio)
SINTOMAS ASOSIADOS	----- --	Nauseas, fosfenos, acuofenos, escotomas y aumento con la actividad física y foto fobia.	Rinorrea, lagrimeo, edema, ptosis palpebral, miosis
EPIDEMIOLOGIA	Mujeres	Mujeres	Varones
DURACION	30 min a 7 días	4 – 72 hrs	15 a 180 min (45 min en promedio)
INTENSIDAD	Leve moderada	Moderada severa	Moderado severa (más severa)
DIAGNOSTICO	<15 días es episódica (<10 crisis infrecuente, >10 crisis frecuente>) >15 días es crónica	Aura: focalidad Sin aura: sin focalidad	>3 crisis al mes de intensidad severa / afecta calidad de vida
TRATAMIENTO	Episódica: paracetamol 1gr AAS 100 mg Ibuprofeno 600 mg Crónica: Amitriptina 12.5 mg nocturno-> aumentar dosis semanal 12.5 mg hasta 75 mg	VO: paracetamol/ ibuprofeno IV: PARACETAMOL + METOCLOPRAMIDA 10 MG Sublingual: Zolmitriptán 2.5- 5 mg	Sumatriptán 50 a 100 mg VO Aporte de o2 al 100 % por 10 a 15 min