



Jorge Yair Alvarado Ramírez

Dra. Karla Sofia López Gutierrez

Vacunación

Pediatría

6 “C”

Comitán de Domínguez Chiapas a 10/04/2025

Varona • BCG (Tuberculosis miningea)	Dosis 0.1 ml	Efectos adversos Paua que se ulcera y causa Cicatriz	Contraindicaciones • SIDA • Tratamiento • Leucemia • Neoplasias • Immunodeficiencia	Via de administracion Tercio medio de la cara antero lateral del muslo	Edad Nacimiento
Hepatitis B	0.5 ml	• Fiebre • Fatiga • Síntomas Easiantesinales	• Fiebre > 38.5° • Hipersensibilidad	Tercio medio de la cara antero lateral del muslo	Nacimiento
Hexavalente acellular (difteria, Tetanos, Tosferina, Polio, Hepatitis B, Haemophilus influenza de tipo B	0.5 ml			Tercio medio de la cara antero lateral del muslo	2, 4, 6, 18 meses
Anirrotavirus	1.5 ml	• Síntomas gastrointestinales • Fiebre • Irritabilidad	• Alergia al latex • Antecedentes intoxicacion • Maternaciones congenitas no correctos del tacto	Tercio medio de la cara antero- lateral del muslo	2, 4 meses
Neumococica. NO conjugada	0.5 ml	• Eritema Dolor induracion Fiebre	• Fiebre > 38.5° • Hipersensibilidad	Tercio medio de la cara antero- lateral del muslo	2, 4, 12 meses Probacion > 60 años
Antrinfluenza	0.5 ml	• Fiebre Mialgia	Alergia al huevo Fiebre > 38.5°	Tercio medio de la cara antero lateral del muslo	6, 7, 18 meses Embarazados
Triple viral SRP	0.5 ml	• Fiebre • Rash • Cefalea • Parotiditis • Meningitis	• Immunodeficiencia • Fiebre > 38.5° • Tuberculosis sin tratamiento	Tercio medio de la cara antero lateral del muslo	12 meses 18 meses 6 años