



Jorge Yair Alvarado Ramírez

Dra. Karla Sofía Lopez Gutierrez

Cuadro comparativo

Pediatrica

6 "C"

Comitán de Domínguez Chiapas a 25/05/2025

	Fisiologica	Isoimmune ABO	Isoimmune RH	Lactancia materna
Inicio	2-3 Días (Nunca < 24 hrs)	Primeras 24 hrs (Leve)	No en 1º embarazo grave en embarazos posteriores	4-7 días hasta 3-12 semanas
Duración	< 10 días	Variable	Variable	3-12 semanas
Tipo de bilirrubina	Indirecta	Indirecta	Indirecta	Indirecta
Mecanismo	Inmadurez hepática y metabolismo neonatal	Ac naturales Anti-A o Anti-B de madre O	Ac naturales anti-A o Anti-B de madre O	Mecanismo desconocido
Inmunoglobulinas asociadas	No aplica	IgG maternos	IgG maternos	No aplica
Grupo de riesgo	RNT y RNPT	Madre O/RN A, B o AB	Madre O/RN	Lactancia materna exclusiva
Clinica	Ictericia leve, sin otros síntomas	Ictericia leve, sin hidrops	Ictericia grave, anemia, hidrops, Kernicterus	Ictericia persistente, sin síntomas graves
Diagnóstico	Clinico y bilirrubina serica	Coombs indirecto (+), directo (+/-), bilirrubina	Coombs directo (+), indirecto (+), bilirrubina	Diagnostico clinico, bilirrubina
Profilaxis	No aplica	No requiere	Gamma globulina anti-D a madre Rh-	No aplica
Tratamiento	Fototerapia si necesita	Fototerapia	Fototerapia o exanguinotransfusión	Continuar LM, suspender 48hrs si se requiere confirmar