



Alexa Martínez Martínez.

Dra. Karla Sofia López Gutierrez.

**Cuadro comparativo, esquema de
vacunación pediátrico.**

Pediatría.

6to "C"

VACUNA	DOSIS	EFECTOS ADVERSOS	CONTRAINDICACIONES	Vía de administración	Edad
BCG (Evita TB meningea).	0.1 ml	Papula que se ulcera y causa cicatriz (90-95%).	SIDA, tx inmunosupresor, leucemia, neoplasias o inmunodeficiencia.	Infiltración intradérmica (Brazo derecho)	Al nacimiento.
Hep B.	3 dosis (al nacimiento, 2 y 6 meses). 0.5 ml	Fiebre, fatiga, síntomas gastrointestinales.	Fiebre > 38.5° hipersensibilidad.	Intramuscular (Músculo vasto externo).	Al nacimiento, 2 y 6 meses.
Hexavalente acelular (dift, tosfe, tetan, polio, hep B, H. Influenzae tipo B).	3 dosis 0.5	Diarrea leve, irritabilidad	Reacción alérgica grave previa, encefalopatía no explicada en los 7 días post. o una dosis previa	Intramuscular	2, 4, 6 y 18 meses
Antrorotavirus.	2 o 3 dosis (dependiendo la marca). 1.5 ml	Síntomas gastrointestinales, fiebre, irritabilidad.	Alergia al látex Antecedentes de intususcepción, malformaciones congénitas no corregidas de hecho GI	Oral	2 y 4 meses (y 6 meses si es de 3 dosis).
Neumococica conjugada.	3 dosis 0.5 ml	Fiebre y micalgia	Fiebre > 38.5° hipersensibilidad.	Intramuscular	2, 4 y 12 meses

VACUNA	DOSES	EFECTOS ADVERSOS	CONTRAINDICACIONES	Vía de Administración	Edad
Anhinfuente	2 dosis 0.5	Febre y mialgias	Alergia al huevo, Guillain Barre por vacuna prena y Febre > 38.5°C.	Intramuscular	A partir de los 6 meses y anual.
Triple viral SPP	2 dosis 0.5	Febre, rash, cefalea, parotiditis, meningitis, purpura.	Inmunodeficiencia, Febre > 38.5°C, enf. Neurológica, TB s/tx, transfusión o que reciben Ig especia 3-11 meses.	Subcutánea	12 y 18 mese
DPT	Retuerto 0.5 ml	Febre y síntomas locales	Anafixia, encefalopatia, enf. Neurológica progresiva, crisis convulsivas.	Intramuscular	4 años.
Anhinfuente.	2 dosis 0.5	Febre y mialgias	Alergia al huevo, Guillain Barre por vacuna prena y Febre > 38.5°C.	Intramuscular	A partir de los 6 mes y anual.