



**Nombre del alumno: Madrid Sánchez
Luis Jaime**

**Nombre del profesor: López Gutiérrez
Karla Sofia**

**Nombre del trabajo: Cuadro de
vacunación**

Materia: Pediatría

Grado: Sexto semestre

Grupo: "C"

Nombre	Via de administracion	Dosis de administracion	Edad de aplicacion	Contraindicacion	Efectos adversos
BCG	Infratrmica	0.1 ml	Alcemento	SIDA, tx inmunosupresor, leucemia, neoplasias o inmunodeficiencia	Papula que se ulceras y causa cicatriz 90-95%.
Hepaditis B	intramuscular	0.5 ml	4 ^{ta} dosis 2 meses 2 ^a dosis 4 meses 3 ^a dosis 6 meses	Fiebre >38.5°C Hipersensibilidad	Fiebre, fatiga, sintomas gastrointestinales
Hexavalente acelular	intramuscular	0.5 ml	4 ^{ta} dosis 2 meses 2 ^a dosis 4 meses 3 ^a dosis 6 meses 4 ^a dosis 18 meses	- Eructos para -convulsiones Alergia al huevo, gluten, derivados de yntuscepcion, modificaciones congenitas o correccion de factor GI	Fiebre, sintomas locales, irritabilidad, petechias en capitulo venoso, exantemas
Antitetanos intramuscular	oral	1.5 ml	1 ^a dosis 2 meses 2 ^a dosis 4 meses 3 ^a dosis 6 meses 4 ^a dosis 12-18 meses	Fiebre >38.5°C Hipersensibilidad	Sintomas gastrointestinales, fiebre, irritabilidad
Neumococica conjugada	intramuscular	0.5 ml	1 ^a dosis 2 meses 2 ^a dosis 4 meses 3 ^a dosis 6 meses 4 ^a dosis 12-18 meses	Fiebre >38.5°C Hipersensibilidad	Eritema, dolor, induracion, fiebre e irritabilidad
Antirrubella	intramuscular	0.5 ml	1 ^a dosis a los 6 meses * Refuerzo anual	Alergia al huevo, Gullon hayre por vacuna previa fiebre >38.5°C	Fiebre y mialgia
Triplicar SRP	subcutanea	0.5 ml	1 ^a dosis 12 meses 2 ^a dosis 18 meses 3 ^a dosis 6 años	Imunodeficiencia, fiebre >38.5°C, Enf. neurológica, TB, SIDA, Transfusion o 14 días 3-11 meses	Fiebre, rash, erupción para: local, meningitis, Rubella
DPT	intramuscular	0.5 ml	1 dosis 45 meses	anafilaxia, anelastolabio, enf. neurológica, crisis convulsiva	Fiebre, sintomas locales
Hepaditis A	intramuscular	0.5 ml	1 ^a dosis 12 meses 2 ^a dosis 18 meses 6-18 mas	Alergia 1 año Reaccion alergica fiebre >38.5°C	Fiebre, diarrea, vomitos, dolor abdominal, ictericia y molestias genitales

Nombre	Vía de administración	Dosis de administración	Edad de aplicación	Contraindicación	Efectos adversos
Varicela	Subcutánea	0.5 ml	1 ^{ra} dosis 12 meses 2 ^{da} dosis 4-6 años 3 ^{ra} dosis 13 años antes de egresar	Inmunodeprimido, gestante, hipersensibilidad	Fiebre, rigidez articular eritema, erupción dolor local
VPH	Intramuscular	0.5 ml	1 ^{ra} dosis 11 años 11-14 años con VPH	Antes de 9 años inmunodeficiencia, fumar, gestación e hipersensibilidad	Síntomas gastrointestinales y locales