

**Universidad del Sureste
Campus Comitán**

Licenciatura en Medicina Humana

**Actividad: Cuadro C. de Esquema de
Vacunación**

Materia: Pediatría

Docente: Dra. Sofía L. Gutiérrez

Alumno: Vázquez López Josué

5to “C”

Comitán de Domínguez Chiapas al día 5 de abril del 2025



Vacuna	Dosis	Efecto Adversos	Contraindicación	Vía de Adm	Edad
BCG (Evita Tb meningea)	0.1 ml	Pápula que se ulcera y causa Cicatriz (90-95%)	SIDA, Tx Inmuno- supresor, leucemia, Neoplasias o Inmunodeficiencia	Intradermica	Nacimiento 2 meses a 4-6 meses
Hepatitis B	0.5 ml	Fiebre, fatiga, Síntomas gastrointestinal	Fiebre $> 38.5^{\circ}$ hipersensibilidad	Intramuscular	Nacimiento 6-18 meses de edad
Hexavalente acelular dift, tosferia, tetano Polio, hep B y H. Influenza tip B	0.5 ml			Intramuscular Profunda	De 2, 4, 6, 18 meses
Antirrotavirus	1.5 ml	Síntomas gastrointestinales, Fiebre, irritabilidad	Alergia a latex, Antecedente de Intubación, Malformaciones congénitas no corregidas de de tracto GI	Vía oral en gotas	2 y 4 meses
Neumococo conjugado	0.5 ml	Eritema, dolor, Irritación fiebre e irritabilidad	Fiebre $> 38.5^{\circ}$ hipersensibilidad	Vía Intramuscular	2, 4 y 12 meses
Antiinfluenza	0.5	Fiebre y mialgia	Alergia al huevo, Guillain barre por vacunación previa y fiebre $> 38.5^{\circ}$ C	Intramuscular	6 meses en adelante
Triple viral SRP	0.5	Fiebre, rash, cefalea, Purpúrida, meningitis, púrpura	Inmunodeficiencia, fiebre $> 38.5^{\circ}$ C, enf. Neurológica TB S/Tx, Transfusión o que reciben IG esperar 3-11 meses	Subcutanea	12 meses x 6 años de edad
DPT	0.5 ml	Fiebre y Síntomas locales	Anafilaxia, encefalopatía, enf. neurológica progresiva Crisis convulsiva	Intramuscular	4 años