



Luis Alberto Ballinas Ruiz

Dra. Karla Sofía López Gutiérrez

Cuadro comparativo

Pediatría

6°

“C”

Comitán de Domínguez Chiapas a 11 de Abril de 2025.

Vacuna	Dosis	Via Administracion	Edad de aplicacion	Contraindicaciones	Efecto adverso
BCG	0.1ml	Intradérmica	Nacimiento	SIDA, Tx inmunosupresor, leucemia, neoplasia o inmunodeficiencia	Populacion que se ulcera y causa cicatriz (90-95%)
Hep B	0.5ml	Intramuscular	Nacimiento	Fiebre > 38.5°C e hipersensibilidad	Fiebre, fatiga y síntomas gastrointestinales
Antidot sueros	1.5ml	Oral	- 2 meses - 4 meses	Alergia al latex antecedente de intuscepcion, malformaciones no corregidas tracto GI	Síntomas gastrointestinales, fiebre e irritabilidad
Poliovacuna triganda	0.5ml	Intramuscular	- 2 meses - 4 meses - 12 meses	Fiebre > 38.5°C e hipersensibilidad	Eritema, dolor, induración, fiebre e irritabilidad
Poliovacuna	0.5ml	Intramuscular	- 6 meses - 7 meses - Anual - Esporádica	Alergia al huevo, Guillain-Barre por vacuna previa y Fiebre > 38.5°C	Fiebre y mialgia
DTaP (SAP)	0.5ml	Subcutánea	- 12 meses - 18 meses - 6 años	Inmunodeficiencia, fiebre > 38.5°C, enfermedades neurológicas, TB, transfuncion o que recibe Ig exógena 3-11 meses	Fiebre, rash, cefalea, parálisis, meningitis, purpura
DTaP	0.5ml	Intramuscular	- 4 años de edad	Anaf. dxo, encefalopatia, enfermedad neurológica progresiva, crisis convulsivas	Fiebre y síntomas locales
Poliovacuna	0.5ml	Intramuscular	- 6 meses - 7 meses - Anual - Esporádica	Alergia al huevo, Guillain-Barre por vacuna previa y Fiebre > 38.5°C	Fiebre y mialgia