



Anan Villatoro Jiménez

Dra Karla Sofia Gutiérrez

Cuadro comparativo

Pediatría

Sexto

C

Comitán de Domínguez Chiapas a 30 de junio del 2025

	RESFRIADO COMÚN	FARINGOAMIGDALITIS	TOS FERINA	BRONQUIOLITIS	ASMA
Epidemiología	Otoño / Primavera Clima templado Guardaños	Infancia	Invierno 6 meses - 3 años > 20 años Px no vacunado Altamente contagioso	3-6 meses Noviembre-marzo Ambiente de fumadores	Alergias Inf. Respiratorio Prematuros
Etiología	Rinovirus 80-90%	Viral 80-90% Rinovirus / coronavirus S. Pyogenes 15%	Bordetella Pertussis (Gram-)	Virus sincitial respiratorio	Hipersensibilidad tipo I
Clinica	Congestión nasal Fiebre Odinofagia Tos / Disfonía Irritabilidad	Criterios Centor	Fase catarral Fase paroxística Fase convalescencia	Día 1-3 Fiebre rinoreya + tos Día 4-6 Taquipnea hipoxia, sibilancias & cianosis Escala Wood D	Tos Disnea Opresión torax Nocturno
Dx	Clinico	Criterios Centor < 2 pts: Sintomático > 4 pts: Atb Cultivo - crónico	Clinico Labs: Linfocitos Cultivo faringeo	Clinica Rx torax Prueba rápida da Ag	Clasificación - Intermitente - Persistente Espirometría
Tx	Paracetamol 10 mg/kg/dosis	Paracetamol PG Benzotínico - 600,000 UI MI < 27kg - 800,000 UI IM > 27kg	FC - Entromicina x 14 días + Vacuna hexavalente Probióticos Vacuna TdPA	Sintomático Nebulizaciones con NaCl O2 - Sat O2 < 90%	Salbutamol