

Nombre del alumno:

Hania Paola Dominguez Franco

**Nombre del profesor. Dra. Karla Sofia López
Gutierrez.**

Nombre del trabajo. Vacunas

Materia: Pediatría .

Grado: 6.

Grupo: "C"

Vacunas

Vacuna	Dosis	Efectos adversos	Contraindicaciones	Via de administración	Edad
BCG CTB meníngea.	0.1 ml	Papovirus que se acerca y causa cataratas	Sida, leucemia, neoplasias, Inmunodeficiencias, H. Inmuno supresor.	Tercio medio de la cara anterolateral del muslo.	Nacimiento.
Hepatitis B.	0.5 ml	Tiembre, fatiga, Síntomas gastrointestinales.	Tiembre $>38.5^{\circ}$ Hipersensibilidad.	Tercio medio de la cara anterolateral del muslo.	Nacimiento.
Hexavalente (difteria, tetanos, tosferina, polio, hep B, haemophilus influenzae).	0.5 ml			Tercio medio de la cara anterolateral del muslo	2 meses 4 meses 6 meses 18 meses.
Antiviral	1.5 ml	Síntomas gastrointestinales. Tiembre Irritabilidad.	Alergia al latex. Anteced. Intususcepción Malformaciones congénitas no corregidas del tracto gastrointestinal final.	Tercio medio de la cara anterolateral del muslo.	2 meses 4 meses.
Neumococo conjugada	0.5 ml	Eritema, dolor, fiebre, induración, irritabilidad.	Tiembre $>38.5^{\circ}C$ Hipersensibilidad	Tercio medio de la cara anterolateral del muslo. Región deltoides del brazo.	2, 4, 12 meses Población mayor de 60 años.

Vacuna	Dosis.	Efectos adversos.	Contraindicaciones	Via de administración	Edad.
Antinfluenza	0.5ml	Tiembre Mialgia	Alergia al huevo Guañin Banté por Vacuna previa Tiembre $>38.5^{\circ}\text{C}$	Tercio medio de la cara anterolateral del muslo Región del biceps del brazo.	6, 7, 18 meses anual 48 meses anual A partir de los 5 años 10-59 años con riesgo >60 años Embarazadas
Triple Viral SRP	0.5ml	Tiembre Dosh Defalea Parotiditis Meningitis Púrpura.	Inmunodeficiencia Tiembre $>38.5^{\circ}\text{C}$ Enferm. neurológicas TB sin tratamiento Transfusiones Reciben Ig, esperar 3-11 meses.	Tercio medio de la cara anterolateral del muslo. Región del biceps del brazo.	12 meses. 18 meses. 6 años.
DPT	0.5ml.	Tiembre Síntomas locales	Anafilaxia Encefalopatía Enferm. neurológica progresiva Crisis convulsivas.	Tercio medio de la cara anterolateral del muslo.	48 meses.