Luis Alberto Ballinas Ruiz

Dra. Karla Sofía López Gutiérrez

Cuadro comparativo

Pediatría

6°

“C”

Comitán de Domínguez Chiapas a 30 de Mayo de 2025.

Nombre	Fisiologica	Por lactancia Materna	Isoinmunitarios	
			Incompatibilidad ABO	Incompatibilidad Rh
Causa	Aumento de bilirrubina indirecta	Acumulación de bilirrubina causada por factores en la leche materna y menor capacidad del hígado para procesarla	Sistema inmune materno crea anticuerpo anti A o B los cuales atraviesan la placenta.	Sistema inmune materno causa lisis de hematíes fetales
Sintomatología	• Ictericia en piel y mucosas	• Ictericia Leve- moderada • Perdida de Peso	• Ictericia temprana • Anemia • Hepatomegalia	• Ictericia intensa • Anemia • Edema • Hidrops fetal
Días de aparición	RNT → 2-3 días RNPT → 3-4 días Duración < 10 días	Inicio 4-7 días hasta 3-12 semanas	24-48 hrs de vida	2-4 hrs de vida
Tratamiento	Observación y continuar LM • Fototerapia de ser necesario	• Fototerapia • Protección solar • Respuesta máxima en 2-6 hrs • No suspender lactancia materna	• Fototerapia • Gammainmunoglobulina • Anti-D	• Fototerapia • Inmunoglobulina Rh