



MAURICIO AGUILAR FIGUEROA

KARLA SOFIA LOPEZ GUTIERREZ

PEDIATRIA

VACUNACION

PASIÓN POR EDUCAR

6 semestre

"C"

Comitán de Domínguez Chiapas a 9 de abril 2025

		Efectos Adversos	Contraindicaciones	Vía de Administración	Etiol
Vacuna	Dosis				
BCG	0.1 ml	Paura que se cicera y causa cicatriz	• SIDA • Leucemia • Neoplasias • inmunodeficiencia	Tercio medio de la cara anteroposterior del muslo	Nacimiento
Herpalilis B	0.5 ml	• Fiebre • Faringitis • Gastritis	• Fiebre > 38.5° • Hipersensibilidad	Tercio medio de la cara anteroposterior del muslo	Nacimiento
Hexavalente Difteria, Tetanos Toxina, Polio Herpalilis B Hemophilus	0.5 ml			Tercio medio de la cara anteroposterior del muslo	2, 4, 6, 18 meses
Anticóvalos	1.5 ml	• sin tomas • Gastritis • Fiebre • Hiperhidrosis	• Alergia al latex • Malignancias congénitas	Tercio medio de la cara anteroposterior	2, 4 meses
Neumococica no conjugada	0.5 ml	• Eritema • Dolor • Fiebre • Irritabilidad	• Fiebre mayor a 38.5 grados • Hipersensibilidad	Tercio medio de la cara anteroposterior al muslo	2, 4, 12 meses > 60 años
Antinfluenza	0.5 ml	• Fiebre • Mialgia	• Alergia al huevo • Fiebre > 38.5°	Tercio medio de la cara anteroposterior de la cara	6, 7, 18 meses 48 meses anual
Triple viral	0.5 ml	• Fiebre • Rash • Cefalea • Meningitis	• inmunodeficiencia • Fiebre > 38.5° • Tuberculosis • Transfusiones	Región deltoide del brazo	12 meses 18 meses 6 años
DPT	0.5 ml	• Fiebre • Síndromes locales	• Alergia al • Encefalopatía • Crisis convulsivas	Región deltoide del brazo	48 meses