



Alexa Martínez Martínez.

Dra. Karla Sofia López Gutiérrez.

**Cuadro comparativo, Ictericia
neonatal.**

PASIÓN POR EDUCAR

Pediatría.

6^{to} “C”

Comitán de Domínguez Chiapas a 31 de mayo de 2025.

ICTERICIA NEONATAL

Nombre	Ictericia fisiológica	Ictericia por lactancia materna	Ictericia isoimunitarias Incompatibilidad ABO	Incompatibilidad Rh
Causa	Aumento en la bilirrubina indirecta.	Desconocida.	Se crean Ac naturales desde el 1er embarazo.	Incompatibilidad del grupo RH (más grave).
Sintomatología	Coloración amarilla de piel y mucosas, sin otros síntomas patológicos.	Ictericia leve a moderada, pérdida de peso	-Ictericia leve (puede agravarse), -No hidrops	Potencialmente más grave (anemia fetal grave), Hiperbilirrubinemia severa, Hidrops
Días de aparición	Inicio: 2-3 días Duración: <10 días	Inicio: 4-7 días hasta 3-12 semanas postnacimiento.	Antes de las primeras 24 horas	Antes de las primeras 24 horas
Tratamiento	Fototerapia si bilirrubina elevada; generalmente no requiere tratamiento	Fototerapia Exanguinotransfusión	Fototerapia	Solicitar coombs: directo/Hb/ Bilirrubina/ albumina Fototerapia Exanguinotransfusión