



**Alumna: Roblero Roblero
Evangelina Yaquelin 6° C**

**Profesor: Dra. Karla Sofía
López Gutiérrez**

**Actividad: Vacunación
Materia: Pediatría**



Comitán de Domínguez Chiapas a 13 de abril del 2025



Nombre	Dosis	Vía de administración	Edad de aplicación	Contraindicaciones	Efectos adversos
BCG (Evita Tb meningea)	0.1ml	Vía intradérmica	En las primeras 48 horas de vida.	SIDA, Tx, inmunosupresor, leucemia, neoplasias o inmunodeficiencia.	papula que se ulcera y causa cicatriz (90-95%)
Hep B	0.5 ml	Intramuscular	1° al nacer 2° 1 y 2 m de edad 3° 6 y 18 meses de edad.	Fiebre >38.5°, hipersensibilidad	Fiebre, fatiga, síntomas gastrointestinal
Hexavalente acelular (dift, tosfe, tetan, poli, hep B y H. influenza tipo B)	0.5 ml	Vía intramuscular	2, 4 y 6 meses de edad	Fiebre, hipersensibilidad	Somnolencia o irritabilidad.
Antirrotavirus	1.5 ml	Vía oral	2, 4, y 6 meses de edad.	Alergia al latex, Antecedentes de intususcepción, malformaciones congénitas no corregidas de tracto GI	Síntomas gastrointestinales, Fiebre, irritabilidad
Neumococcal conjugada	0.5 ml	IM en el deltoides o en el muslo.	2, 4, 6 y 11 meses.	Fiebre >38.5° hipersensibilidad	Eritema, dolor, induración, fiebre e irritabilidad.
Antiinfluenza	0.5 ml	IM en el muslo izquierdo en <18 meses de edad >18 meses, se aplica en el brazo izquierdo.	6 meses de edad	Alergia al huevo, Guillain barre por vacuna previa y fiebre >38.5°C	Fiebre y mialgia

Nombre	Dosis	Vía de administración	Edad de aplicación	Contraindicaciones	Efectos adversos
Triple Viral SRP	0.5 ml	Vía subcutánea en el brazo	1º 12 meses de edad, 2º 6 años de edad	Inmunodeficiencia, Fiebre $\geq 38.5^{\circ}\text{C}$, enf. Neurológicas, TB S/Tx, Transfusión o que reciben la esperar 3-11 meses	Fiebre, rash, cefalea, parotiditis, meningitis purpura.
DPT	0.5 ml	Vía intramuscular en el brazo o en el muslo	2 meses 4 meses 6 meses 15-18 meses 4-6 años.	Anafilaxia, encefalo- patía, enf. Neurológica progresiva, crisis convulsivas	Fiebre y síntomas locales