



Nombre del alumno: Karina Montserrat Méndez Lara.

Nombre del profesor: Karla Sofía López Gutiérrez.

Nombre del trabajo: Vacunación.

Materia: Pediatría.

Grado: 6

Grupo: "C"

Vacuna	Dosis	Edad	Efectos adversos	Contraindicaciones	Vía de Ad.
BCG (Evita Tb meníngea).	0.1 ml	• Nacimiento. • 2 meses. • 4 meses. • 6 meses.	• Papula que se ulcera y causa cicatriz (90-95%).	• SIDA. • Tx inmunosupresor. • Leucemias. • Neoplasias.	• Intradérmica. • Cara externa, sup. del brazo.
Hep B	0.5 ml	• Nacimiento. • 6-18 meses.	• Fiebre. • Fatiga. • Síntomas gastrointestinales.	• Fiebre > 38.5°C. • Hipersensibilidad.	• IM, músculo izq.
Hexavalente acelular (dift., tosfe, tetan, polio, hep B y H). Inf. Tipo B	0.5 ml	• 2 meses. • 4 meses. • 6 meses. • 18 meses.			• IM, profunda en el músculo derecho.
Antirrotavirus	1.5 ml	• 2 meses. • 4 meses.	• Síntomas gastrointestinales. • Fiebre. • Irritabilidad.	• Alergia al latex. • Ant. de suspensión. • Malformaciones congénitas no corregidas del tracto GI.	• VO en gotas.
Antirinfluenza	0.5 ml	• 6 meses en adelante.	• Fiebre. • Mialgia.	• Alergia al huevo. • Guillain Barre por v. pre. • Fiebre > 38.5°C.	• Intramuscular. • músculo izq. y brazo izq.

Vacuna	Dosis	Edad	Efectos adversos	Contraindicaciones	Vía de Ad.
Neumocócica conjugada	0.5 ml	2 meses 4 meses 12 meses	- Eritema - Dolor - Induración - Fiebre - Irritabilidad	- Fiebre $>38.5^{\circ}\text{C}$ - Hipersensibilidad	Tercero medio de la cara anterolateral.
Triple viral SAP	0.5 ml	12 meses 6 años	- Fiebre - Rash - Cefalea - Parotiditis - Meningitis - Purpura	- Inmunodeficiencia - Fiebre $>38.5^{\circ}\text{C}$ - Enf. neurológicas - TB S/Tx - Transfusión - IG $\rightarrow$ Esperar 3-11 meses	Subcutánea en el brazo
DPT	0.5 ml	4 años	- Fiebre - Síntomas locales	- Crisis convulsivas - Anafilaxia - Encefalopatía - Enf. neurológica progresiva	Intramuscular

Bibliografía:

- Secretaría de Salud. (2012). Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2012, Prevención y control de enfermedades. Diario Oficial de la Federación