

Nombre del alumno:

Hania Paola Dominguez Franco

**Nombre del profesor. Dra. Karla Sofia Lopez
Gutierrez**

**Nombre del trabajo. Tipos de ictericia
neonatal.**

Materia: Pediatría.

Grado: 6.

Grupo: "C"

Tipos de ictericia neonatal.

Nombre	Ictericia fisiológica	Ictericia por lactancia materna	Incompatibilidad por Rh.	Incompatibilidad ABO.
Causa	<ul style="list-style-type: none"> o Fisiológica o Sepsis o TORCH o Anemias hemolíticas. 	<ul style="list-style-type: none"> o Sepsis o TORCH o Lactancia materna o Obstrucción intestinal. 	<ul style="list-style-type: none"> o Hemólisis o Sepsis o TORCH. 	<ul style="list-style-type: none"> o Hemólisis o Sepsis o TORCH.
Clínica	o Tenido icterico	o Tenido icterico	<ul style="list-style-type: none"> o Ictericia o Anemia hemolítica grave o Hídrops fetal. 	<ul style="list-style-type: none"> o Puede aparecer icterico o Anemia leve.
Días de aparición	o 2do al 3er día	o Fin de la primera semana.	o Al nacer	o Primeras 24 horas.
Tratamiento	No preciso Vigilancia	Suspender 1-2 días LM y posteriormente aumentar el nº de tomas	<ul style="list-style-type: none"> o Fototerapia o Exanguino-transfusión o gammaglobulina anti-D 	<ul style="list-style-type: none"> o Fototerapia o Exanguino-transfusión