

**Universidad del Sureste
Campus Comitán
Licenciatura en Medicina Humana**

**Actividad: Cuadros Comparativo de Caput y
Cefalohematoma**

Materia: Pediatría

Docente: Dra K. Sofía L. Gutiérrez

Alumno: Vázquez López Josué

5to "C"

Comitán de Domínguez Chiapas al día 27 de Febrero del 2025



Caput

Tumor de parto

Cefalohematoma

Hematoma.

Son dos condiciones que afectan el Coerto Cabeludo de los recién nacidos.

Edema de tejido
Célular Subcutáneo


Contenido
Líquido Serohemático

Inicio
En el momento del
parto

No respeta
Suturas

Resolución en
24-48 horas

Piel Suprayacente
Equimótica o eritema



Hemorragia
Subperióstica

Contenido
Líquido hemático

Inicio
hora después del
parto

Respeta Suturas

Resolución 2 semanas
a 3 meses

Piel Suprayacente
Normal

Definición:

Es una hinchazón suave y redonda en la parte superior de la cabeza.

Causas

Se debe por la presión del útero y el canal del parto durante el nacimiento.

Síntomas: La hinchazón puede ser suave y firme y tiene dolor todo o nada.

Definición

Es una acumulación de sangre entre el hueso y el periostio (membrana que cubre el hueso) en la cabeza.

Causas

Se debe por la ruptura del vaso sanguíneo durante el parto.

Síntomas: La hinchazón puede ser firme y tener color azulado o morado.

