



**Alumna: Roblero Roblero  
Evangelina Yaquelin 6° C**

**Docente: López Gutiérrez  
Karla Sofía**

**Actividad: Cuadro  
comparativo**

**Materia: Pediatría**

Comitán de Domínguez Chiapas a 02 de marzo del 2025

## CAPUT SUCCEDANEUM

Edema de tejido celular subcutáneo

### Contenido:

Líquido serohemático  
(mezcla de suero y sangre)

### Inicios:

En el momento del parto

No respeta suturas

### Resolución:

En 24-48 horas

Piel suprayacente:  
Equimótica o eritema

- Asociado a parto prolongado.
- Hematoma por encima del perióstio
- Gruesa las suturas, edema, petequias y equimosis en piel
- No requiere tratamiento

## CETALOHEMATOMA

Hemorragia subperiosteal

### Contenido:

Líquido hemático

### Inicios:

Horas después del parto.

Respeto suturas

### Resolución:

2 semanas a 3 meses  
(se reabsorbe)

Piel suprayacente:  
Normal

- Menos común, asociado a parto prolongado e instrumentado
- Secundario a ruptura de los vasos que atraviesan el perióstio.
- No cruza las suturas, se puede asociar a fracturas del cráneo y hemorragia intracraneal
- Piel normal