



Córdova Morales Adonis Omar

Dra. Karla Sofía López Gutiérrez

Pediatría

Cuadro comparativo de ictericias

6to. semestre

“C”

Comitán de Domínguez Chiapas a 24de mayo del 2025

Características	Incompatibilidad Rh	Ictericia fisiológica	Incompatibilidad ABO	Ictericia por lactancia materna exclusiva
Inicio	Primeras 24 hrs de vida	2-3 días Dura ≤ 1 semana	Primeras 24 hrs de vida	< 7 días Dura > 2 semanas
Mecanismo	Hemolisis inmune por anticuerpos anti-D	Inmadurez hepática y aumento de eritrocitos	Hemolisis por anticuerpos anti-A o anti-B	Disminución de la ingesta y aumento de la reabsorción intestinal
Clínica	Ictericia intensa rápida aparición de anemia	Ictericia leve y moderado en cara y va de forma cefalocaudal	Ictericia intensa Anemia leve	Color icterico leve o moderado
Grupo sanguíneo	Madre Rh negativos / Rh positivo	N/A	Madre grupo O / Rh grupo A o B	N/A
Dx	Retículoцитos Bh Grupo Rh Presencia de sig	Inicio después de los 24 hrs de vida Bilirrubina $> 5 \text{mg/dl}$	- Bh - Retículoцитos - Coombs - Grupo Rh	Bilirrubina total $> 5 \text{mg/dl}$
Tratamiento	Fototerapia - Exanguinotransfusión	Vigilancia Fototerapia	Fototerapia Exanguinotransfusión	Suspender 1-2 días la lactancia y aumentar el número de fototerapia