

Nombre del alumno: Elvin Caralampio Gómez Suárez

Nombre del profesor: Dra. Karla Sofia López Gutiérrez

Nombre del trabajo: Vacunación

Materia: Pediatría

Grado: 6

Grupo: "C"

Comitán de Domínguez Chiapas a 10 de abril de 2025.

VACUNA	D0515	EDAD	EFECTOS ADVERSOS	CONTRAINDICACIONES	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
ANTI INFLUENZA	0.5 ml	6 meses en adelante		*Alergia at humo 'Guillan barro per vacuna preuso :Fischer > 38.5	·Intranuscular muslo seq. · Brazo seq
TRIPEL YIRAL SRP	0.5 1	· 12 meses · 6 anos de edad	·Fichre ·Rash ·Cafalea ·Parehiditis ·Meningutis	*Inmunodeficiencia *EnC. Neurologicas *Emsfusiones to que receiven 16 *Fiebre >38.5	Subculanca en el brazo
TAG	0.5 _m	4 0.703	-Fichie -Sintonas locales	· Anefilaxia · Encefalopalía · Enf. Neurológica progresiva · Crisis consulavos	•Intramuscular
BCG (Evita The managera)	0.1 _A 1	·Nacimiento ·2meges ·4 meses ·6 meses	Papula que oc Jesta y causa escatriz (90-454)	· S.da	-Intradermica cara externa superior del braz
HEP B	0.5 m	* Nacimiento *6-18 meses	·Frebre ·Fatiga ·Sintomon gastrointestinales	·Fiebre 238.5 ·Hiporocopolitidad	·latramuscular
HEXAVALENTE ACELLLAR (Diff, Toofe, Totan, polio, Hap B, Hap H, Laftenear lipe O)	0.5-1	•2 meses •4 meses •6 meses •18 meses			·latearuscular profunda en el nucla derecha
Antirotavirus	1.5-1	• 2 meses • 4 meses	*Sintomas gaptrointeshada • Fiebra • Irritabilidad	· Alorgia al latex · Antecedentes de infususcopción · Malfornaciones congenitas no corregidas de tracto Gl	-VO en gotas
NEUNOCOCICA CONJUGADA	0.5 -1	-2 meses -4 meses -12 meses	· Erstena · Octor · Induración · Frebre · Irritabilidad	*Fiebre >38.5 *Hipertensibilidad	·Tercio medio de la cura orherolateral

Bibliografía:

• Secretaría de Salud. (2012). Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2012, Prevención y control de enfermedades. Diario Oficial de la Federación