



Diana Citlali Cruz Rios

Dra. Karla Sofía Gutiérrez

Unidad 2

Pediatría

6° “C”

Vacunación

VACUNA	DOSIS	EFEECTO ADVERSO	CONTRAINDICACIÓN	VIA	EDAD
BCG (Erit. Tb meningea).	0.1 ml	Popcha & se cicera y deja cicatriz (90- 95%).	SIDA, tx inmunosupe- sor, leucemia, neopla- sias o inmunodefici- encia.	Intrader- mica.	Nacimiento.
Heb B	0.5ml	Fiebre, fatiga, sx gastrointestinales.	Fiebre > 38.5°C. Hipersensibilidad.	Intra- muscular.	Nacimiento
HEXAVALENTE (Difteria, tosferina, tetanos) Polio, hep B, H.I. tipo B.	0.5ml.			Intra- muscular.	1 → 2 meses 2 → 4 meses 3 → 6 meses 4 → 18 meses
ANTIROTAVIRUS	1.5ml	Sintomas gastro- intestinales, fiebre, irritabilidad.	Alergia al latex, antece- dentes de intususcepción, malformaciones congénitas no corregidas de tracto IG.	Oral.	1 → 2 meses 2 → 4 meses
NEUMOCOCCICA CONJUGADA	0.5ml	Eritema, dolor, indura- ción, fiebre e irritabi- lidad.	Fiebre > 38.5°C, hiper- sensibilidad.	Intra- muscular.	1 → 2 meses. 2 → 4 meses. 3 → 12 meses.
ANTIINFLUENZA	0.5ml.	Fiebre y mialgia	Alergia al huevo, G. barre por vacna previa & fiebre > 38.5°C.	Intra- muscular.	1 → 6 meses 2 → 7 meses Anual → 18 meses 4 años
TRIPLE VIRAL SRP	0.5ml	Fiebre, rash, cefalea, Paratiditis, meningitis, purpura.	Inmunodeficiencia, fiebre > 38.5°C, enf. neurológica, Tx o/tx, transfusión o q reciben IG esperar 3-11 meses.	Sub- cutanea.	1 → 12 meses 2 → 18 meses 6 años.
DPT	0.5ml	Fiebre y síntomas locales	Anafilaxia, encefalopa- tia, enf. neurológica progresiva, crisis con- vulsivas.	Intra- muscular.	Refuerzo → 4 años.