Universidad del Sureste

Campus Comitán

Licenciatura en Medicina Humana

Actividad: Cuadro Comparativo de la clasificación de ictericia neonatal

Materia: Pediatría

Docente: Dra Sofía Gutiérrez

Alumno: Vázquez López Josué

6to “C”

Comitán de Domínguez Chiapas al día 23 de mayo del 2025

Nombre	Causa	Sintomatología	Días de aparición	Tratamientos
Ictericia Fisiológica	Inmadurez del hígado para metabolizar bilirrubina	Coloración amarillo de piel y mucosas, sin otros signos graves.	2-4 día de vida	Observación. Fototerapia: si la bilirrubina esta elevada.
Ictericia por lactancia materna	Baja ingesta de leche materna en los 1ro días. Sustancias en la leche materna	Ictericia leve-moderada, perdida de peso	3-7 día de vida	· Fototerapia · Mejorar la técnica de lactancia
Ictericia Isoinmonitaria (Incompatibilidad ABO)	· Madre grupo O, bebe A o B: - anticuerpo anti-A o B atraviesa placenta. · Incompatibilidad de grupo Sanguíneo ABO	Ictericia temprana, anemia, palidez, Hepatoesplenomegalia	24-48 horas de vida	Fototerapia Intensiva Inmunoglobulina IV Exanguinotransfusión
Ictericia Isoinmonitaria (Incompatibilidad RH)	madre Rh negativo, bebé Rh positivo. · Incompatibilidad de grupo Sanguíneo RH.	Ictericia Intensa, anemia, edema, hidrops fetal en casos graves.	24 horas de vida.	Fototerapia Inmunoglobulina Rh Exanguinotransfusión