



**Nombre del alumno: Luis Fernando
Ruiz Pérez**

**Nombre del profesor: Dr. Adolfo Bryan
Medellín Guillen**

**Nombre del trabajo: Cuadro
comparativo**

Materia: Enfermedades Infecciosas

Grado: Sexto Semestre

Grupo: C

Patología	Dengue	Chikungunya	Zika
Definición	Enfermedad infecciosa viral sistémica y dinámica transmitida por el vector <i>Aedes aegypti</i> y <i>Aedes albopictus</i> .	Enfermedad vírica aguda transmitida por la picadura de mosquito infectado <i>Aedes aegypti</i>	Enfermedad viral aguda porque es transmitido mosquito infectado.
Agente etiológico	Virus del dengue Genero: Flavivirus	Virus de chikungunya Genero: <i>Alforivirus</i> Familia: <i>Togaviridae</i>	Virus del zika <i>Arbovirus</i> Genero: <i>Flavivirus</i> Familia: <i>Flaviviridae</i>
Vector	<i>Aedes aegypti</i> <i>Aedes albopictus</i>	<i>Aedes aegypti</i> <i>Aedes albopictus</i>	<i>Aedes aegypti</i>
clasificación	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Caso no probable dengue no grave ◦ Caso probable con datos de alarma ◦ Caso probable dengue grave 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Aguda ◦ Subaguda ◦ Crónica 	<ul style="list-style-type: none"> Caso probable Caso confirmado
Cuadro clínico	Fiebre 1 a 5 días + 2 siguiente signo y sintoma: Nausea, vómito, exantema, mialgia, artralgia, cefalea, dolor retroocular, petequias	Fiebre $>39^{\circ}\text{C}$ Artralgia Poliartricular Cefalea, lumbalgia Nausea, mialgias conjuntivitis	Exantema 3-5 días después de inicio fiebre: Fiebre 39°C - 39°C Cefalea, conjuntivitis, prurito, dolor retroocular, contacto sexual
Diagnostico	<ul style="list-style-type: none"> ◦ NS4 ◦ PCR ◦ IgM / IgG 	<ul style="list-style-type: none"> Fiebre + viajes a zonas endémicas ◦ RT-PCR ◦ IgM 	<ul style="list-style-type: none"> PCR Clínica
Tratamiento	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Sintomático ◦ Reposo en cama y uso de eabellon ◦ Hidratación ◦ Paracetamol 	<ul style="list-style-type: none"> Reposo en cama Fiebre \rightarrow Paracetamol Medidas físicas 	<ul style="list-style-type: none"> Sintomático Hidratación Paracetamol
consideración especial	Embarazada Pediátricas Comorbilidad Adulto Mayor	<ul style="list-style-type: none"> USO de óxido de zinc ◦ sub agudo: uso de aine 	<ul style="list-style-type: none"> Factores de riesgo materno ◦ Defecto craneo-faciales y tubo neural.

BIBLIOGRAFIA

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA gpc.