



Luis Alberto Ballinas Ruiz

Dr. Erick Antonio Flores Gutiérrez

Cuadro comparativo

Técnicas Quirúrgicas Básicas

6°

“C”

Comitán de Domínguez Chiapas a 11 de Abril de 2025.

Nombre de tejido	Origen	Absorbible / No absorbible	Fabricación	Fuerza tensil	Tiempo de absorción	Indicaciones
Colgajo simple	Intestino, tendones, de membranas o otros, bovino	Absorbible	Monofilamento	5-10 días	70-90 días	- Lig. vasos pequeños, grietas, accidental - Intestinales
Colgajo circumcise	- Animal			14-15 días	> 90 días	- Vas biliares - Vas urinarias
Colgajo pedículo propio						
Rede de glicolitos	Sintético	Absorbible	Multifilamento	> 15 días	80 días	- Tejido subcutáneo - Lig. y otros profundos
Rede de glicolitos				> 25 días	105-115 días	- Lig. y otros profundos
Rede de glicolitos				> 25 días	140-180 días	- Tejido subcutáneo - Lig. y otros profundos
Algodón	Vegetal	No absorbible	Multifilamento	> 25 días	No absorbible	- Tejido subcutáneo - Lig. y otros profundos
Hilo de lana				> 25 días	140-180 días	- Tejido subcutáneo - Lig. y otros profundos
Seda	Origen animal	No absorbible	Monofilamento	> 25 días	No absorbible	- Tejido subcutáneo - Lig. y otros profundos
Nylon	Sintético	No absorbible	Monofilamento	> 25 días	No absorbible	- Tejido subcutáneo - Lig. y otros profundos
Poliuretano						
Poliéster						
Polipropileno						
Poliéster						
Alambre	Mineral	No absorbible	Monofilamento		No absorbible	- Tejido subcutáneo - Lig. y otros profundos
Alambre						